



ПАЛ ҲЭРРЕШИЛИКТЕ ВЕТЕРИНАРИЯ САНИТАРИЯ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ МЕТОДИКАЛЫҚ ҚОЛЛАНБА

BEEKEEPING GUIDE
VETERINARY SANITARY RULES IN BEEKEEPING

Uzbekistan, 2024



Бул методикалық қолланба Өзбекстан Республикасы ICARDA шериклик шөлкеми буйыртпасы тийкарында “Қарақалпақстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўын еле де раўажландырыў” темасы шеңберинде ислеп шығарылды. Қолланба Өзбекстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўы менен шуғылланыўшы ҳәм пал ҳәррешилик пенен шуғылланыўды қелеўшилер ушын пал ҳәррелери семьясын раўажландырыў ҳәм көбейтиўде азықлық дереклери, өсимлик ҳәм аўыл хожалық егинлериниң гүллеў ҳәм нектар, гүл шаңын бериў дәўирлери бойынша билимлерин өз ишине алған.

Дүзиўшилер:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети “Ветеринария ислерин шөлкемлестириў ҳәм ветеринария санитария экспертизасы” кафедрасының аға оқытыўшысы Ғойибов О.Ш., Ташкент қалалық пал ҳәррешилер ассоциация баслығы Мусаев Ф

Рецензент:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети Зоотехния ҳәм жипекшилик кафедрасының доценти Эшдавлатов О.



Фаррух Мусаев



Отабек Ғойибов

Мазмуну

Кирисиў	3
1 Пал ҳәррешиликте ветеринария-санитария қағыйдалары	5
2 Жуқпалы емес кеселликлер	7
2.1 Химиялық зәхәрлениў	7
2.2 Қара палдан (падъ палынан) зәхәрлениў	9
2.3 Нектардан зәхәрлениў	11
2.4 Гүл шаңынан зәхәрлениў	14
2.5 Дуздан зәхәрлениў	16
2.6 Белок жетиспейшилиги кеселлиги	16
2.7 Углевод (пал, қант) жетиспейшилиги кеселлиги	17
3 Жуқпалы кеселликлер	19
3.1 Америка шириў кеселлиги	19
3.2 Европа шириў кеселлиги	22
3.3 Септицимия	23
3.4 Қалташа тәризли личинка	25
3.5 Лөң (паралич, мешел)	26
3.6 Аскосфероз	27
3.7 Аспергиллөз	28
3.8 Меланоз	30
4 Паразитар кеселликлер	32
4.1 Ворроатоз	32
4.2 Акарапидоз	37
4.3 Браулөз	40
4.4 Тропилапсоз	41
4.5 Нозематоз апис хәм нозематоз серано	43
5 Пал ҳәррелердин душпанлары хәм пал ҳәррелер менен азықланыўшылар	46
5.1 Қуслар	46
5.2 Насекомалар	46
6 Әдебиятлар дизими	53



Толық атиниз:



Логин:




Пароль:

Кирисиў

Пал ҳәррелер кеселликлерден зыянлагғанда оларда азықланыў, дем алыў ҳәм басқа тиришилик етиў процесслериниң турақлылығы бузылып, өмири қысқарады ҳәм нәтийжеде өнимдарлық көрсеткишлери пәсейеди. Кеселликлерден зыян көрген пал ҳәррешилик хожалығында қәўип дәрежеси артып барады, белгили бир кеселлик ошағына айланыў дәрежеси көбейеди. Пал ҳәрре кеселликлерин емлеў, алдын алыў, оған қарсы гүресиў жолларын оқып үйрениў ҳәм әмелий билимлерге тийкарланған ҳалда қәниге менен шерикликте жумыс алып барыў әҳмийетли.

Пал ҳәррешиликте ветеринария хызметин шөлкемлестириў ушын кеселлерди анықлаў, емлеў, алдын алыў, оған қарсы гүресиў жумысларын шөлкемлестириў менен шуғылланыў ҳәм де жетистирилетуғын пал өнимлериниң сапасын тәмийинлеў мақсет етип белгилениўи шәрт.

Пал ҳәррешиликте тийкарғы ҳәм басланғыш ветеринария-санитария қағыйдалары: пал ҳәрре ящиклерин қурғақ самалдан тосылған орынларда, тийкарғы магистрал жол ҳәм темир жоллардан 500 метр узақлықта, кондитер кәрханалары, шарўа фермаларынан 5 км қашықлықта жайластырыў керек.



Ҳәр бир пал ҳәрре ящиклерин шөлкемлестириӯде төмендегилерге әмел етиӯ усыныс етиледи: аймақта нектар ҳәм гүл шаңын беретугын өсимликлер дүньясы, пал ҳәрре семьяларының саны ҳәм пал ҳәрре уяларының аралығы бир-биринен 3-3,5 метр, қатар аралығы 5-10 метр болыӯы тийис.

Пал ҳәррешилик хожалығындағы бирлемши қағыйдалар: қадағалаӯ тәрзиси қойылатугын орын болыӯы ҳәм суӯ ыдыслары орнатылыӯы, ҳәр бир хожалықта пал ҳәрре кире алмайтуғын соталы рамкалар сақланатугын қоймаханалар, ҳәжетхана, душ ҳәм кийинип шешиниӯ ушын бөлме болыӯы усыныс етиледи.

Ҳәр бир пал ҳәррешилик хожалығында пал ҳәррелер семьясы санынан келип шығып 10-15% дан кем болмаған қосымша пал ҳәрре уялары болыӯы керек.

Бул оқыӯ материллары пал ҳәррешилик пенен шуғылланатугын пал ҳәррешилиер ушын әмелий қолланба болып табылады. Пал ҳәррешилик көп мийнет ҳәм итибар талап ететугын тараӯ болып, пал ҳәррелерди бағыӯда ветеринария санитария қағыйдаларына әмел етилиӯи өним алыӯда тийкарғы орын ийелеӯи тастыйықланған.

Егер сиз пал ҳәррешилик пенен шуғылланатугын болсаңыз биринши орында устаз бенен әмелий процесслерди үйрениӯиңиз талап етиледи.

Пал ҳәррешиликте әмелдеги барлық ветеринария санитария қағыйдалары бул қолланбада келтирилген. Усы әмелий қолланбада пал ҳәррешиликте ветеринария санитария қағыйдалары, пал ҳәрре кеселликлериниң түрлери, зыянкеслери, душпанлары ҳәм олардың алдын алыӯ ҳәм қарсы гүресиӯ илажлары көрсетип берилген.

1. Пал ҳәррешиликте ветеринария-санитария қағыйдалары

Өзбекстан Республикасы аймағында пал ҳәррелерди раӯажландырыӯ, бағыӯ, сақлаӯ ҳәм аӯыл хожалық ҳәм энтомофил өсимликлерди шаңландырыӯ ҳәм пал өнимлерин алыӯ ушын пал ҳәррешилик пенен шуғылланыӯшы субъектлерди ветеринария-санитария қағыйдалары тийкарында искерлигин белгилеӯ ҳәм пал ҳәррелер семьяларының саламатлығын тәмийинлеӯ ушын ветеринария-санитария илажларын өткериӯде ислениӯи тийис болған көрсетпелерге әмел етиӯ шәрт.

Ветеринария санитария қағыйдаларына төмендеги жағдайларда әмел етиледи:

- пал ҳәрре семьяларын пал ҳәррешилик хожалығына орнатыӯ ҳәм үскенелеӯде;
- пал ҳәрре семьяларын елатлы пунктлер ҳәм дачаларға қәуипсиз жайластырған гезде;
- пал ҳәрре семьяларын көшириӯде;
- пал ҳәррелерди сақлаӯ, бағыӯ, азықландырыӯ ҳәм раӯажландырыӯда;
- пал ҳәрре кеселликлерин даӯалаӯ ҳәм алдын алыӯда;
- пал ҳәррешилик өнимлерин алыӯда;
- пал ҳәррелердиң генофондын ҳәм популяциясын қорғаӯда.

Ветеринария санитария қағыйдаларының тийкаргы түсиниклери:

- **пал хәррешилик хожалығының техника қәуипсизлиги**—пал хәррешилик хожалығында ислейтуғын хызметкерлер менен жәрдемшилерди жарақатлардан хәм пал хәррениң шағыуынан қорғау илажлары;
- **пал хәрре душпанлары**—пал хәрре уясында, пал хәрре хожалығына жақын жерде жасаушы, пал хәм пал хәррелер менен азықланыушы омыртқалы хәм омыртқасыз хайуанлар;
- **пал хәрре зыянкеслери**—пал хәрре өними менен азықланыушы, пал хәрре уясында уақтында жасаушы омыртқалы хәм омыртқасыз хайуанлар;
- **пал хәрре кеселликлери**—пал хәрре семьяларының жуқпалы, инвазив хәм жуқпалы емес кеселликлер менен кеселлениуи;
- **пал хәррелердин инфекциялық кеселликлери**—пал хәрре организмде патоген (кеселлик тарқатыушы) вируслар, бактериялар, замаррықлар тәсиринде пайда болатуғын кеселликлер;
- **пал хәррелердин инвазив кеселликлери**—паразит гельминтлер, өрмекши тәризилер, насекомалардың тәсиринде кешетуғын кеселликлер;
- **пал хәррелердин жуқпалы емес кеселликлери**—пал хәррелерди бағыу, сақтау, күтім көрсету хәм азықландыру қағыйдаларының бузылуы ақыбетинде келип шығатуғын кеселликлер;
- **пал хәрре кеселлигине диагноз қойу**—кеселликтің жуғыу себеби хәм факторларын үйрениу хәм анықтау;
- пал хәррешиликте ветеринария көриги-ветеринар тәрепинен атқарылатуғын жұмыстар;
- **паль палынан зәхәрлениу**—айырым өсимликлердин денесинен ямаса насекомалардан ажыралып шығатуғын ширелердин тәсиринде жүзеге келетуғын патологиялық процесслер.
- **пал хәррелердин зәхәрлениуи**—үлкен жастағы пал хәррелер хәм личинкаларда зәхәрли затлар тәсиринде кешетуғын жуқпалы емес кеселлик;
- **мараторвирус паралюзиясы**—пал хәрре семьясының хәлсиреуи хәм ғалабалық қырылуы менен жуымақланыушы вируслы кеселлик болып, кеселликтің қозғатыушысы (Maratorvirus paralusis) нейровирус, яғнай бас мий, көкирек хәм қарын ганглиясы, жиңишке ишеклерде қозғатыушының көбейуи менен характерленеди;
- **акарапидоз**—үлкен жастағы аналық хәм еркек хәррелердин трахеясында жайласқан Akarapiswoodi кенеси арқалы шақырылатуғын инвазив кеселлик;
- **аскофероз**—3-4 күнлик еркек хәррениң урығы хәм исши пал хәррелердин урығында Askosphaeraapis замаррығы арқалы хәк тәризли қозғатылатуғын кеселлик;
- **браулёз**—аналық хәм исши пал хәррелерде Braula Coesa паразитлик өмир сүретуғын насеком, яғнай пал хәрре бийти палы бар ямаса личинкалар жататуғын соталарда жүреди;
- **варроатоз**— пал хәррелер, пал хәрре личинкасы хәм оның жатағында

- *Varroa jacobsoni* кенесінің паразиттік өмір сүріуі ақыбетінде келіп шығатуғын инвазив кеселлік;
- **тропилелапсоз**-пал хәрре урығы хәм қуыршағын сорып варроатозға қарағанда үш есе тез көбейетуғын кене.
- **ветеринария-санитария паспорты**-пал хәррешілерге берілетуғын ветеринария шыпакери тәрәпинен толтырылған хәм районлық ветеринария бөлімі бас ветеринария врачы тәрәпинен қол қойылған хәм мөр менен тастыйықланған хұжжет;
- **дезинфекция**-кеселлікті қозғатыушыларды (бактерия, вирус, замаррық, риккеция ғ.б.) зыянсызландыруға бағдарланған эпизоотияға қарсы илаж;
- **мелиоз**-*Meloe variegates* қоңызы арқалы шақырылатуғын замаррықлы кеселлік хәм қысқа уақыт ишінде аналық хәррениң өлімі менен жууақланатуғын инвазив кеселлік;
- **нозематоз**—үлкен жастағы пал хәррелер, аналық хәм еркек пал хәррелердің инвазив кеселлігі, *Nosema apis* паразиті орта бөлім ішеклердегі эпителий қабатында паразиттік өмір сүріуі менен кешеді; пал хәррениң ішін сорыйды
- **сенатаниоз**— үлкен жастағы пал хәррелердің инвазив кеселлігі болып, *Senotaini atricuspis* личинкасы менен зыянланыудан келіп шығады; сенатани шыбыны пал хәррениң денесіне мәйек қояды.
- **Қалта тәрізлі личинка**—*Maratorvirus aetatulae* арқалы шақырылатуғын инфекциялық кеселлік;
- **шириу**-личинкалардың инфекциялық кеселлігі, *Bacillus larvae* споралы бактерия үлкен жастағы, үш күнлік хәм ушыу жасындағы личинкаларды зыянлау ақыбетінде келіп шығатуғын кеселлік. Америка хәм Европа ширіу кеселліклерінен айырып таныу керек;
- **қумырысқалар**—пал хәм пал хәрре менен азықланатуғын кеселлік тасыушы зыянкес;
- **жабайы хәрре хәм хәрре тәрізлілер (*Vespa formica*)**—пал хәррелер душпаны, гүзде пал хәррелердің уясын бузып, пал урлайды;

2. Жуқпалы емес кеселліклер

2.1. Химиялық зәхәрлениу

Ауыл хожалық егінлерінің зыянкеслеріне қарсы химиялық зәхәрлі препараттарды қолланғанда пал хәррелер ууланып қалады. Пал хәррелерде химиялық зәхәрлениу оларға тәсір етіуші заттардың күшіне қарап тез ямаса системалы тәрізде әсте зәхәрлениу арқалы набыт болыуы мүмкін. Контактлы тез тәсір ететуғын зәхәр берілген ауыл хожалық егінлерінен пал хәррелер нектар жыйнау дәуірінде, ямаса олар әтирапынан ушып өтіп баратырған гезде зәхәрленеді хәм набыт болады.

Бундай жағдайда зәхәр пал хәрре шаңарағына күшли тәсір етпейді, себебі зәхәрленген пал хәррелер егін майданында набыт болады. Системалы әсте тәсір етіуші зәхәрлер керісінше барлық семьяны зәхәрлеп, набыт

салып келеди.



Сүүрөм: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Кеселлик ақыбетинде жүзеге келетуугын өзгерислер (клиник белгилери)-системалы эсте тәсир етиўши уўлар себилген егинлерден нектар хәм гүл шаңын жыйнаў ўақтында зәхәрленген пал хәррелер уяларына келип, нектарды қабыллаўшы хәрреге береді хәм нектар тасыўшы хәррелерге жоллама берип үлгереді. Нәтийжеде уядағы басқа пал хәррелер де набыт болады. Өйткени, күшли пал хәрре семьяларынан көп санда нектар тасыўшы хәррелер зәхәрленген аймаққа барып, нектар алып келеди хәм үлкен жастағы личинкаларды соны менен бағады хәм набыт етеди

Нәтийжеде пал хәрре семьясы толық қырылып қалады. Органикалық уўлы затлар менен зәхәрленген пал хәррелер жүдә тынышсызланады, уядан ушып шығып қулай баслайды хәм тез-тез нәпес алып шыр гүбелек айланады, бираз ўақыттан соң тынышланып, кейин набыт болады.



Сүүрөм: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Диагноз-химиялық зәхәрлениўди анықлаў ушын зәхәрленген пал хәрре семьясынан 500 ге шекем пал хәрреси, 100 гр пал, 15x15 см ли соталар ишиндеги гүл шаңы ямаса уўланып өлген личинкалар хәм химикат себилген өсимлик (зәхәр изи, орны қалған) жапырақлары лабораторияға тексерийге жибериледи.

Пал хәррелер хәм палды таза шийше ыдысқа салып ямаса майлы қағазға орап, уй себилген өсимликти қатты қағаз пакетке салып жибериледи. Лабораторияға үлги менен бирге хат ямаса химикаттың аты хәм қандай жол менен дәриленгенлиги көрсетилген акт қосып жибериледи. Үлги жүдә тез жиберилиўи шәрт, болмаса ол пилисленип ширий баслайды. Лабораторияда биологиялық ямаса химиялық жол менен диагноз қойылады.



Алдын алыў хәм қарсы гүресиў-пал хәррешилер жергиликли өсимликлерди қорғаў мәкемелериниң хызметкерлери хәм фермер хожалықлары энтомологлары менен ушырасып, олар менен байланыста болыўи хәм фермер хожалығы жерлерине пал хәррелерди әкелип атырғанлығы туўралы жазба түрде хабар бериўи талап етиледи

Сүўпем: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп алынды.

Егер бағлар хәм егинлер энтобактерин, дендробацилин сыяқлы микробиологик препаратлар менен қайта исленгенде олар пал хәррелерге зыян келтирмейди.

Егинлер химиялық уйлы затлар менен гүллеўден алдын дәриленеди. Бундай дәрилеў жумысларын баслаўдан алдын пал хәрре семьяларын дәри себилетуғын аймақтан 5 км алыста сақлайды. Егер пал хәрре семьяларын алып шығыўдың илажы болмаса, онда пал хәрре уяларының қақпағы астына сетка жаўып, қақпағы жабылады хәм пал хәрре киретуғын тесиклери ағаш тахташалар менен тығыз етип бекитиледи. Хәр күни сол пал хәрре семьяларына суў бериледи. Уя қақпағын жабыўдан алдын уя ишине бос соталы рамкалар қойып, уяның ишки көлеми кеңейтиледи. Бул ислер себилетуғын зәхәрли затлардың тәсири даўам етиў уақытына хәм олардың пал хәрре семьясына қаншелли тәсир етиўине қарай әмелге асырылады. Өсимликлер сынап хәм фторлы дәрилер қосындысы менен дәриленгенде пал хәррелерди уядан 5 күн даўамында; гексахлоран тиофос хәм опатокс пенен дәрилегенде 3 күн; метафос пенен дәрилегенде 2 күн; анабазин, никотин хәм пиретрум менен дәрилегенде 5 саат даўамында шығармай керек.

Гүресиў илажлары. Зәхәрленген пал хәрре семьялары 3-4 күн даўамында суйық қант сиропы менен азықландырылады. Егер кеселлик созылса, онда шаңарақтан гүл шаңы бар соталы рамкаларды алып, еритиўге тасланады

2.2. Падь палынан зәхәрлениў

Кеселлик пал хәррелер хәм личинкаларының падь палынан зәхәрлениўи себепли жүзеге келеди.



Жазда бундай азықтан пал хәррелердің уўланып өлиўи онша көзге тасланбаса да, қыста пал хәррелер бундай азық пенен қысласа, онда пал хәррелердің өлими айтарлықтай билинеди. Жаўын-шашын, суўық күнлери шире гүбелегиниң раўажланыўы азаяды, хәм жаўын ширелердің хәм бөлинип шыққан шире тәризли суўық шығындыларды жуўып кетеди.

Сүўпет: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп алынды.

Қурғақ хәм ыссы келген жаз хәм гүз мәўсимлери ширелердің раўажланыўына қолай шәраят жаратады. Сонлықтан, падь палы пүткил мәўсим даўамында өсимликлердің гүллеў-вегетация дәўиринде пал хәррелер өзлери ушын алып келиўи мүмкин. Өсимлик жапырағындағы, денесиндеги падь палы хәр түрли микроорганизмлердің раўажланыўына мүмкиншилик береді, падь палынан зәхәрлениў имканын асырады. Падь палынан зәхәрлениў оның қурамындағы денеге сорылмайтуғын қурамалы қантлар (яғный мелизитоза, манноза, лактоза, экеулин), микроорганизмлер бөлип шығарған, глюкозид, санонин хәм минерал дузлардың муғдарына байланыслы.

Падь палын терек хәм путалардан: тораңғыл, тал, ақ терек, клён, липа, ақ қайың, дуб, каштан, амур сирени сыяқлы тереклер ажыратады. Солардың ишинде черёмуха, дуб, каштан, амур сирени, бархатлардан жыйналған падь палы зәхәрлирек саналады.



Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерислер (клиникалық белгилер)-жазда падь палын жыйнаў ўақтында тийкарынан ушыўшы, яғный нектар тасыўшы пал хәррелер кеселленеди хәм 2-3 күнде набыт болады. Личинкаларды бағыўшы жас хәррелер хәм личинкалар да кеселлениўи мүмкин. Қыста кеселлик әсте өтеди, қыстың екінши ярымында пал хәррелерде иш кетиў бақланады.

Сүўпет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп алынды

Падь палынан зәхәрленгенде ас сиңириў системасында күшли бузылыс жүзеге келип, пал хәррелердің өлими бақланады. Жазда 3-5 күнлик личинкалар набыт болыўы мүмкин. Падь палынан уўланған пал хәррелер тынышсызланады, көпшилиги жерге ямаса уя түбине қулайды. Жазда кеселленген пал хәррелердің уясы этирапында жерде өрип жүргенин көриўге болады, қарны томпайып кетеди.

Қыста падь палынан зәхәрленген пал хәррелердің уясынан жағымсыз шириген нәрсенің ийси шығады. Семьяны тексеріп көргенде уя дийәалларында, уяның хәрре киретуғын тесиклерінде хәррелердің тоқ қоңыр тезегін көріу мүмкін. Уяның астында хәм уяның хәрре киретуғын тесиги алдында пал хәрре өликлери жатады. Орта ишеги кеселленген хәррелер ширигенге ұсап, бөліп шығарыу ўақтында қарынша бөлиминен тез үзилип кетеди. Ишегиниң реңи тоқ қоңыр, қаралтым ямаса ашық қоңыр түсте болады. Семья ишиндеги соталы рамкалардағы пал тойғын қоңыр яки кофе реңине ұқсаслығын, гүл палының ийиси жоқ екенлигин, мазасы онша күшли емеслигин хәм жағымсыз темир дәми келиўин оргонолептик тексеріу арқалы анықлау мүмкін.



Сүўпет:

*https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүклеп алынды.*

Диагноз-Кеселлик пал хәррелердің өзін тутыуы, хәрекети, орта ишектің патологиялық хәм анотомиялық өзгерислери, клиникалық белгилери хәм пал қурамында қара пал (падь палы) бар екенлигине қарап қойылады. Пал хәрре уяларындағы соталы рамкалардағы палдың көриниси, мазасына қарап ямаса палы бар соталы рамканы қуяш нурына тутқанда гүл палының реңи сары түсте болса, қара пал (падь палы) қуяш нурында қаралаў-қоңыр түсте болады.

Сапалы палда айрықша пал ийси болады хәм гүл палы аўызда тез ерип, аўыздағы силекейге араласып кетеди. Ал, падь палы айрықша өткир ийиске ийе болады хәм тәсиршеңлиги сезилмейди ямаса пүткиллей болмайды.

Қара пал да мудама қаралаў түске ийе болмай, ал жылтыр көринистегилери де болып, мазасы сәл ашқылтым хәм қышқыл болады.

Анық диагноз химиялық тексеріу өткерилгеннен кейин қойылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-жазда кеселленген семьяларға 1-1,5 литр 50% қант сиропы беріп азықландырылады. Қыста кеселленген семьялар гүл палы, қант ямаса бир аз ызғарланған қант бөлекшелери менен азықландырылады.

2.3. Нектардан зәхәрлениу

Бул жуқпалы емес кеселлик болып, тийкарынан нектар жыйнаўшы жумысшы пал хәррелердің нектардан зәхәрлениу бақланады.

Өсимлик гүллеринен нектар жыйнап атырғанда пал хәррелер айырым өсимликлердің уўлы нектарынын зәхәрленеди. Зәхәрли нектарды төмендеги өсимликлер бөліп шығарады: ақ қурай, айлантус, япон сафорасы, лалагүл хәм лалақызғалдақ, тамырлы пияз гүли, каштан, көк шешек, бангидуана хәм басқа зәхәрли өсимликлер. Айырым өсимликлердің уўы адамлар ушын да зыянлы

саналады. Мысалы, лютик хәм багульник, бул өсимликлер гүллеген ўақтында гүл шаңын жыйнаў усыныс етилмейди. Олардың зәхәрлилик дәрежеси тамырындағы, пақалындағы, жапырақларындағы алколоидлар хәм глюкозидлар хәм сапонинларға байланыслы болады. Уўлы зат нектар менен бирге ишек дийўалларында сорылып, қанға өтеди хәм өткир зәхәрлениў себепли пал хәррелер хәрекетсиз болып қалады. Бундай зәхәрлениў ўақтынша болып, пал хәррелер саўалып кетиўи мүмкин.

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерислер (клиникалық белгилер)- тийкарынан зәхәрли нектар ажыратылыўы ҳаўа райы температурасы төмен болыўы ақыбетинде жүзеге келеди. Кеселликтің раўажланыўы тез болыўы мүмкин, айырым жағдайларда әсте өтиўи мүмкин. Кеселлик жедел өтиў ўақтында нектар жыйнаўшы пал хәррелер зәхәрленип, тез набыт бола баслайды хәм уясына уўлы нектарды алып келиўге үлгермейди. Бундай жағдайда онша көп болмаған нектар излеўши (разведкашы) пал хәррелердің набыт болыўы бақланады. Палды алғанда пал хәррениң семьясы онша зыян көрмейди.

Кеселликтің әсте раўажланыўында пал хәррелер нектарды уясына алып келиўге, нектар тасыўшы жұмысшы пал хәррелерди нектар тасыўға қосыўға үлгереді хәм нектар бар жерге көп санлы нектар жыйнаўшы пал хәррелер ушып барып, уясына зәхәрли нектар алып келиўи ақыбетинде личинкалар зәхәрленип өлиўи мүмкин. Бунда көбирек нектар жыйнаўшы пал хәррелер зыян көреді.

Кеселлик май айының ақыры ямаса июнь айының басларында басланып 15-25 күнге созылыўы мүмкин. Кеселликтің раўажланыўына ҳаўа температурасының төменлеўи, жаўын, ҳаўа райының қурғақ келиўи себеп болыўы мүмкин. Гүллерден нектар шығып баслаўы менен пал хәррелер зәхәрли нектар шығаратуғын өсимликлерге барыўын тоқтатады.



Сүўрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_rchyol сайтынан жүклеп алынды

Кеселлик белгилери дәслеп нектар жыйнаўшы пал хәррелерде пайда болады. Жас пал хәррелер хәм еркек пал хәррелер азырақ кеселленеді. Кеселленген хәм набыт болған пал хәррелерди гүллеринде нектар топлаған зәхәрли нектар ажыратыўшы өсимликлер астында, уясына қайтыў бағдарында, уя этирапында хәм уя ишинде ушыратыў мүмкин. Кеселленген пал хәррелер ушыў қәбилетин жойтады. Зәхәрленген пал хәррелердің булшық етлери тез зыян көрип, қанатлары, аяқлары, мурты хәм қарын бөлеги ләң бола баслайды. Бундай жағдайда пал хәррелердің өмири бәрқулла өлим менен жуўмақланбайды. Пал хәррелердің бир бөлеги биринши күни-ақ тәўир болып кетеди.

Өсимликтер ажыратқан зәхәрли нектар хәр түрли тәсир күшине ийе болып, айырым уўлы нектардан зәхәрленгенде пал хәррелер дым тынышсызланып, этирапындағы адамларға, хайўанларға хужим жасайды. Кеселлик 15-20 күн даўам етеди. 7-10 күн өткеннен кейин зәхәрлениўден барлық пал хәррелер набыт болады.

Мысалы, аққурай өсимлигиниң гүллеўи басында хәм қоршаған орталық температурасы 500Сқа көтерилгенде өзинен эфир ажыратады хәм пал хәрре зәхәрленеди, бирақ хәмме пал хәррелер набыт болмайды, өрмелеп жүрген пал хәррелердиң саяға жетпегени ғана набыт болады. Аққурай өсимлиги ажыратқан эфирли пал тек ғана жумысшы пал хәррелерге тәсир етеди.

Рододендрон поптикум (*Rhododendron ponticum*) өсимлигиниң нектарынан дәслепп ушыўшы, кейин уядағы жас жумысшы пал хәррелер, жупласқан аналық хәрре, жумысшы пал хәрре хәм еркек пал хәрре личинкалары набыт болады. Тийкарынан күшли пал хәрре семьяларындағы пал хәррелердиң набыт болыўы бақланады. Айырым семьяларда ана хәрре хәм ана хәрре личинкасы набыт болады.

Кеселленген пал хәррелердиң туўры ишеги созылған ҳалда, сары жылтыр суйықлық пенен толған болады, сол суйықлық пенен пал хәррелер азықландырылса, пал хәррелер зәхәрленеди. Ишектеги суйықлық микроскоп астында тексерилгенде рододендрон өсимлигиниң гүл шаңы бар екенлиги анықланады.

Кеселленген пал хәррелер хәм үсти ашық личинкаларды пал хәррелер дәрхал уядан шығарып таслайды. Үсти бекитилген соталардағы личинкалар сарғайып, қарайып кетеди, пал хәррелер соталардың үстин ашып, сыртқа шығарып таслайды.

Диагноз-нектардан зәхәрлениўде кеселлик тез басланып, нектар жыйнаўшы пал хәррелер кеселленеди. Олар бираз ўақытқа шекем жасаўы мүмкин, көпилик пал хәррелер саўалып кетеди. Ишеклериндеги патолого-анатомик өзгерислер билинбейди.

Нектар ямаса палдағы гүл шаңы бөлекшелериниң дүзилисине қарап зәхәрли нектар ажыратыўшы өсимлик түрин анықлаў мүмкин.

Алдын алыў хәм қарсы гүресиў-хәррелер жайласқан аймақта басқа шире ажыратыўшы өсимликтер менен бирге гүллейтуғын шире ажыратыўшы өсимликтер бар екенлигине исеним туўдырың.

Нектардан зәхәрленгенде, пал хәрре суў ишиўи ушын қойылған наўаға 5% сиркениң бир ас қасығын 10 литр суўға араластырып салынады, пал хәррелер 30-50% қант сиропы менен азықландырылады. Қант сиропы берилген күнниң ертеңине кеселлик жоғалады. Пал хәррелер басқа зәхәрли нектар ажыратпайтуғын өсимликтер гүлине ушыўы ушын үйретиледи.

Зәхәрленип набыт болған пал хәррелерди жыйнап, бос пал хәррелер уясына жуқа етип жайып қойылса, олар 20-25-30°С ыссыда өзлериниң күшлерин сақлап, тағы өмирге қайтады.

2.4. Гүл шаңынан зәхәрлениү

Уўлы өсимликлер гүл шаңынан зәхәрлениү арқалы жүзеге келеди. Өсимликлер гүл шаңынан зәхәрлениү кем ушырайтуғын жағдай болып, көбинесе шире беретугын өсимликлер ширени аз ажыратады хәм пал хәрре мәжбүрий гүл шаңы менен нормадан тыс азықланады, нәтийжеде иши қатыўына хәм пал хәрре организмнің зәхәрлениўине алып келеди. Жас пал хәррелерде кеселлик зәхәрли өсимликлердің гүл шаңы менен азықланыўы нәтийжесинде раўажланады. Нектар жыйнаўшы пал хәррелер уўлы өсимликлер гүл шаңын уяға алып келеди, бирақ өзлери зыян көрмейди, себеби гүл шаңын артқы аяқларындағы гүл шаңы қалташаларына салып алып келеди. Гүл шаңы менен тийкарынан жумысшы пал хәррелер азықланады хәм олар зәхәрлениўге бейим.



Сүўпет: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп алынды

Жас пал хәррелер туқымлық пияз гүли шаңынан, бангидуана, темеки, багульник, ақ хәм қара чермерица хәм басқа зәхәрли өсимликлер гүлшаңын нормадан тыс қабыллағаны ушын зәхәрленеди.

Зәхәрлениү белгилери гүл шаңы менен азықланғаннан 25 минут өткеннен хәм кем дегенде 5 саат өткеннен соң басланады. Зәхәрлениү пал хәррелер денесиндеги суў балансын да бузады. Себеби гүл шаңының сиңиўи ушын жүдә көп суў ишиледі. Орта хәм арқа ишеклеринде көп санлы гүл шаңының бөлекшелери топланып, пүткил дене бойлап зәхәр тарқалыўы күшейеди хәм олар тынышсызланып, қарынларын толтырып, уядан сүйрелип шығып набыт болады. Пал хәррелер 3-13 күнлигинде тийкарынан 10 күнлигинде набыт болады.

Кеселликтің клиникалық белгилери - тийкарынан гүл шаңынан зәхәрлениү қысқа ўақыт ишинде өтип кетеди. Кеселлик онша көп болмаған жас пал хәррелердің кеселлениўи хәм набыт болыўы менен басланып, соңғы күнлери кеселленген пал хәррелер көбейип, суткасына жүзлеп, айырым жағдайларда мыңлап набыт бола баслайды. Соң, атыздан нектар келе баслаўы менен набыт болыў хәм кеселлениү азаяды.



Сүйрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүктеп алынды.

Бундай жағдай тийкарынан, май айында жүз бергени ушын да май кесели деп аталған, айырым жағдайларда июнь, июль айларында да бақланады. Негизи личинкаларды азықландырыушы жас жұмысшы пал хәррелер кеселленеди. Кеселленген пал хәррелер уясынан тез өріп шығып, жерге қулайды хәм өледі. Дәлеп кеселленген пал хәррелер тынышсызланады, соң әсте хәлсиреп тынышланып қалып, қалтыраған халда өле баслайды. Кеселленген хәм набыт болған пал хәррелердің ишеклери гүл шаңына толып, қарны томпайып кетеді.

Диагноз-гүл шаңынан зәхәрлениу бойынша диагноз пал хәррелердің жағдайы хәм патолого-анатомик өзгерислерин микроскопта тексеріу арқалы қойылады.



Сүйрет: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүктеп алынды.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу- айырым аймақларда жыллық мәүсимлик метрологиялық өзгерислер нәтийжесинде кеселлик мәүсимге сәйкес болып, айырым түрдеги өсимликлердің гүллеуине туұра келип, мине сол дәуірде кеселликтің алдын алыу мақсетинде хәр мудамы пал хәрре семьяларын суў ямаса 30-35% лы қант сиропы менен тәмийинлеп турыу зәрүр.

Кеселлик қысқа мүддетли болып, тәбияттан нектар келе баслауы менен тез тоқтайды. Кеселлик узақ созылғанда пал хәрре семьялары суйық қант сиропы менен азықландырылады. Азықландырыу кеште пал хәррелер ушыуы тоқтағаннан кейин 1-2 күн ишинде алып барылады. Қант сиропы 0,5-1 л ямаса пал хәррелердің күши хәм азықлық запасына қарай бериледи. Буннан тысқары, пал хәрре семьясы жеткиликли суў менен тәмийинлениуи ямаса суў арнаұлы ыдыста берилиуи керек.

2.5. Дуздан зәхәрлениү

Пал хәррелер көп муғдарда ас дузын қабыллау ақыбетинде, яғный пал хәррелер турып қалған суў хәуизлеринде ямаса зәхәрли дуз муғдары көп болған көлмеклерден суў ишиуи ақыбетинде жүзеге келеди.

Дуздан зәхәрлениү пал хәррелердин денесине азықлық ямаса суў арқалы көп муғдардағы пал хәрреси ушын зыянлы минерал дузлар түсиуи арқалы жүз береді. Бундай жағдай пал хәррелерди қумшекер шығындылары менен азықландырғанда оның қурамында минерал дузлар, 0,5% лы ас дузы хәм суў қурамында минерал төгинлер араласқан болыуы ямаса қурамында минерал дузлар көп болған нектар жыйнауы ақыбетинде бақланады. Азықлық қурамында 2% лы хәм одан артық ас дузы ямаса басқа дузлар болыуы пал хәррелердин өлиминге алып келеди.

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерислер (клиникалық белгилер)- кеселлик гүзде, қыста хәм бәхәрде пал хәррелер қант сиропы менен азықландырылғанда ямаса қурамында минерал дузлар көп болған суўды ишкен ўақытта белгили болады.

Кеселликте пал хәррелердин тынышсызланыуы, уяда дауысларының күшейиуи хәм пал хәррелердин уядан өрмелеп шығыуы бақланады. Пал хәррелер босаң болып, ушыу қәбилетин жойтып, иши өтеди. Дуздан зәхәрлениү қыста болса пал хәррелердин тығыз болып топланған топары бузылады. Тийкарынан жумысшы пал хәррелер кеселленеди.

Диагноз-дуздан зәхәрлениүде азықты химиялық тексериу арқалы анықланады. Ауқат қалдығы өртеледи, қалдықтағы дуздың пайыз муғдары анықланып кеселликке диагноз қойылады. Инфекция хәм инвазив кеселликлер жоқ екенлигине исеним туўдырылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресиу-таза ишимлик суў менен тәмийинлеу зәхәрлениудин алдын алыуда запас азықтың қурамындағы дуз муғдары анықланып, нормадан артықша дуз болған азықлықлар алмастырылады.

2.6. Белок жетиспеушилиги кеселлиги

Пал хәррелер бәхәрги раўажланыу дәуиринде үсти ашық личинкаларға белок жетиспеушилиги себепли жүзеге келеди. Гүл шаңы жетиспеушилиги хәм сапасызлығы себепли азықландыратуғын пал хәррелерде белок зат алмасыу процеси бузылады хәм жаман ақыбетлерге алып келеди. Олар тез арада азып, денелери киширейип, жеңил болып, тез қартая баслайды. Бир ўақыттың өзінде личинкалар белоклы азық жетиспеушилиги нәтийжесинде мәйеклерге күтим тоқтайды, иннен шығып атырған пал хәррелер күшсиз болып, 3-10 күнде набыт болады.

Кеселликтин клиникалық белгилери-кеселлик бәхәр хәм жаздың ақыры хәм гүз айларында жүзеге келеди. Гүл шаңы, яғный белок жетиспеушилиги нәтийжесинде пал хәрре семьяларында гүл шаңы кем яки улыўма болмағанда личинкалар, жас хәм үлкен жастағы пал хәррелер набыт болады. Аналық хәрре

қойған мәйекке күтім көрсетілмейді, яғный мәйек болады бірақ қуыыршаққа айланбайды, нәтижеде аналық хәрре мәйек қойыуды тоқтатады. Семьяда пал хәррелердің рауажланыуы тоқтайды. Ал, күзде қыслауға қартайған пал хәррелер киреди хәм қыслау уақтында набыт болады.

Диагноз-кеселликке пал хәрре семьясында соталы рамкаларда запас гүл шаңы (перга)ның кемлиги ямаса болмауы, атыздан жаңа гүл шаңының келмеуі нәтижесінде ана хәрре мәйек қоймауы, жас хәм қартайған пал хәррелердің өлиуі хәм личинкаларын соталардан шығарып таслауына қарай кеселликке диагноз қойылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресиу-бәхәрден баслап пал хәрре семьялары белок (гүл шаңы) пенен тәмийинленип, хәр бир семьяда кемінде 2-3 соталы рамкада гүл шаңы болыуы керек. Белок гүл шаңы жетиспеушилиги жағдайларында олардың орнын басыушы басқа белоклы бирикпелер соя уны ямаса мәкке уны менен азықландырыу усыныс етиледі.

Кеселликке қарсы гүресиуде де пал хәрре семьяларын қосымша белок (гүл шаңы) менен тәмийинлеу зәрүр.

2.7. Углевод (пал, қумшекер) жетиспеушилиги кеселлиги

Пал хәррелерде углевод яғный қант, пал, крахмал улыума алғанда тийкаргы азық жетиспегенде жылдың барлық мәусимлерінде пал хәррелер набыт болыуы мүмкин. Бәхәрде өткен мәусимнен қалған углеводты қабыллап болғаннан кейин ямаса басқа уры пал хәррелер тәрeпинен урланыуы ақыбетінде пал хәррелер ашлықтан өлиуі, жаз мәусимінде тәбияттан нектар келмейтуғын дәуирде хәм хауа райының қолайсыз келиуі нәтижесінде, ал күзде өзге семьялардың уры пал хәррелери хәм сары жабайы пал хәррелер тәрeпинен азықлардың урланыуы, пал хәрре семьяларының ишки көлемин күзде кемейтиу ақыбетінде тосық тахташасы артында қалған пал хәррелер аш қалып набыт болыуы мүмкин. Ал, қыста қыслауға қалдырылған соталы рамкалардағы запас азықтың жетиспеушилиги ямаса семьяның ишки көлемин қыслауға топлау уақтында палы бар соталы рамкалардың орынсыз жайластырылыуы хәм соталы рамкалардағы қыслауға қалдырылған азықлықтардың, мысалы: пахта, айғабағар, жантақ, аққурай палының қатып қалыуы нәтижесінде пал хәррелер набыт болады.

Кеселликтің клиникалық белгилери-пал хәррелер ашлықтан жүдә тез өле баслайды. Қыслау уақтында азықлық жетпей қалғанда пал хәррешилер тезлик пенен анықлап жәрдем бермесе семьялар қыслау мәусимінде набыт болады. Жаз мәусимінде ашлықтан нектар жыйнаушы пал хәррелер набыт болады. Себеби, пал хәррелер семьясында азықлық болмаса ямаса кем муғдарда болса, бунда атызға ушыушы пал хәррелер нектар тасыу хәм излеу ушын уядан пал қалташаларына пал алмай шығып кетеди хәм нектар тауа алмай ашлықтан набыт болады. Хауа райының сууық ямаса жауын күнлери уядағы соталарда пал азығы болмаса ямаса пал орнын пал хәррешилер қант сиропы менен

толтырып азықландырып турмаса, пал хәррелер уяда набыт болады.

Жаз мәүсिमінде семьяда азықлық запас болмаса пал хәрре киретуғын тесикшелер алдында уядан шығарып тасланған личинкалар көп болады. Базыда личинкалар менен бирге көп санлы өлген пал хәррелер де болады. Өлген пал хәррелердің пал қалташасы, орта хәм арқа ишектери бос болады. Соткаларда пал азығы болмайды, себеби тәбиятта пал беретуғын өсимликтер болмайды. Уяда азықлық болмаған жағдайларда пал хәррелер уяны таслап кетип, басқа семьяларға қосылып кетеди ямаса басқа жақларға ушып кетеди.

Пал хәрре семьяларын қыслаў ўақтында еситип көргенде, айрықша даўыс шығыўын сезиў мүмкин. Аш қалған пал хәррелер азық излеп бос соталы рамкалардан биринен-бирине өтип, қуўраған жапырақлар сылдырлысына уқсас бөлент даўыс шығарады хәм нәтийжеде барлық пал хәррелер набыт болыўы мүмкин.

Пал азығы қатып, бөлекшелер жағдайында уя түбине төгилген болып, өлген пал хәррелер арасында қатып қалған пал бөлекшелерин ушыратыў мүмкин болады.

Диагноз-пал хәрре семьяларын тексерип, еситип көрип, егер пал хәррелер сес шығармай атырған болса, уя дийўалына урып тақылдатады. Егер пал хәррелер сес шығармаса, онда пал хәррелер өлген болады. Пал хәррелер соталарға басларын тығып өледиди.

Рамкалардағы пал қатқан болса, онда уя түбинде жүдә көп қатқан бөлекше формасындағы қантлар бақланады. Семьяның ишин ашып көргенде соталы инлердеги палы бар соталардың көп бөлегинде үсти жабылған воциналары ашылған болып, хәмме соталардағы азықлар қатып қалған болады. Соталардағы азық деректери қатып қалғанда, пал хәррелер тынышсызланып, бөлент даўыс шығарады. Егер пал азығы сапалы болып, пал қурамында суў кем болып, глюкоза муғдары көп болыўы есабынан қатып қалған болса, онда палы бар рамкалардың үстине сийле ямаса пахта ызғарлап қойылса пал хәррелер тынышланады. Егер сонда да пал хәррелер тынышланбай даўыс шығарса онда азықлық қурамында сапасыз милизитоza ямаса басқа зыянлы элементтер болыўы мүмкин. Пал хәррелерге ығаллық ямаса суў берилгенде де тынышланбаса сапалы азықлық бериў керек болады. Соталы рамкаларда пал хәррелердің суйық шығындылары хәм көп санлы өлген пал хәррелер болады.

Алдын алыў хәм қарсы гүресий-хәр бир пал хәрре семьясына қыслаў ушын **10-15** кг нан кем болмаған азықлық қалдырылады. Палы толық соталы рамкалар пал хәррелер топарының жыйналатуғын орнының еки шетинде, палы бираз кемиреги хәр бир рамкада **1,5-2** кг барлары ортасында жайласыўы керек. Гүзде басқа пал хәррелер урлыққа келмеў илажлары көриледиди. Бәхәрде семьялардағы азықлық **8-9** кг нан кем болмаўы керек.

Пал хәрре семьяларына азықтың жетиспейшилиги анықланғаннан кейин, төмендеги азықлардың бир түри менен азықландырылады.

Қойыўланып қатып қалған палдан 1-2 кг муғдарында таза қағазға салып, аўқат

жейтуғын шанышқы жәрдеминде көп санлы тесикшелер пайда етип тесиледи хәм семья ишиндеги соталы рамкалар үстине қойылады.

Пал хәрреси семьяларын азықлар қосындысы қурамы менен азықландырғанда 3-5 бөлек қант унтағына (пудра) 1-1,5 бөлек жақсы таў палынан араластырып, яғный 3 кг қумшекерге 1 кг пал ямаса 5 кг қумшекерге 1,5 кг 50-60°C температурада қыздырылған пал жақсылап араластырылып, бир тегис қолға жабыспайтуғын дәрежеде қарылып, хәр 9 кг қант унтағына 3-4 куб мм ямаса 3-4 гр есабында сирке кислотасы қосып таярланады хәм таярланған қамыр сыяқлы азықлықтан 1-2 кг нан бөлеклерге бөлинип, желим қалташаларға, қағазға орап ямаса пластмасса баклажкалар бир тәрөпинен ұзынына кесилип (қамыр сыяқлы азықлықты салыў ушын) оны еки қаптал тәрөпинен пал хәррелер кирип қамыр сыяқлы азықлықты алыўы ушын пышақ ямаса қайшы жәрдеминде тесикшелер тесип қойылады.

Баклажка қақпағы да шешип қойылса сол тесиктен де пал хәррелер кирип азықты алады. Желим қалташаға хәм қағазға оралған ямаса баклашкаға салынған азықлар соталы рамкалар үстине қойылады.

Мине сол таярланған қамыр сыяқлы азыққ қурамына кеселликлердің алдын алыў ушын керекли антибиотик ямаса замаррық кеселликлериниң алдын алыўшы дәрилерден қосып таярланса да мақсетке муўапық болады. Себеби қант унтағы хәм пал қосып таярланған азықлыққа қант сиропы менен бағыўға қарағанда азырақ уры хәррелер келеди.




Сүўрем: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп алынды.

3. Жуқпалы кеселликлер


3.1. Америка шириў кеселлиги

Кеселлик март-апрель айлары ҳаўа райының ыссы ўақытларында ушырасады. Бул 3-9 күнлик аўзы жабық личинкалардың жуқпалы кеселлиги болып, личинкалар қуўыршаққа айланыў ўақтында ширип набыт болыўы, пал хәрре семьяларының хәлсиреўи менен характерленеди. Кеселлик пенен жумысшы пал хәрре жетик қуўыршақлары, аналық хәрре хәм кем жағдайларда



Сүйрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүктеп алынды.



Сүйрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүктеп алынды.

еркек хәрре личинкалары кеселленеди. Кеселликти узынлығы 2-5 мкм, ени 0,5-0,7 мкм болған таяқша тәризли Лавре бацилласы тарқатады. Микроб бацилласы шыдамлы болып, өлген пал хәрре ямаса қара мумда 10 жылға шекем, оның спорасы палда хәм қуяш нурында 4-6 хәпте, суўда 900Сқа шекем қыздырылғанда 3 саат, 1000Ста 13 минут, пал хәм суў 1:1 қатнасында араластырып қыздырылғанда 20 минут даўамында жасайды. Кеселликти тарқатыўшы дерек кесел пал хәрре семьясы есапланады.

Кеселликтиң клиникалық белгилери-

кеселликтиң жасырын дәўири 3-7 күн даўам етеди. Дәслеп личинкалы рамкаларда бир неше кеселленген личинкаларды ушыратыў мүмкин, олардың саны артып барыўы менен сасық ийис пайда болады. Кесел личинканың денесіндеги буўын сақыйналары жоғалып, күлрең түске, кейин сүтли кофе реңине өзгередиди.

Личинкалы соталар үсти жабылғаннан кейин сотаның жабылған үсти бираз шөгип, қарайып тесикше пайда болады. Личинкалардың териси жуқарып тез үзиледи. Кеселлик басланғаннан кейин шама менен 4 хәптеде кеселленген личинка тоқ қоңыр түске киреди хәм тоқымалары шашылып кетеди. Бир айдан соң шириген личинка қатады хәм қабыққа уқсап инниң дийўалына жабысып қалады. Оларды пал хәррелер тазалай алмайды, нәтийжеде жуқпалы кеселлик инде қалып кетеди.



Сүйрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүктеп алынды.

Диагноз-үсти жабылған соталар тесиги қаралай реңде болып, ишине шөккен соталарды саў соталар арасында ушыратыў мүмкин, шириген личинкалардың өлиги созылып ағаш устасы желиминиң ийиси келеди. Кеселленген пал хәррениң уясы бөлек ажыратылып, кесел личинкалардан үлги алынып ветеринария лабораториясына кеселликти тексерий ушын жибериледи.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-Пал хәррелерди тығыз сақлау, кесел семьядағы сау пал хәррелер басқа дезинфекцияланған уяға көшириледі, кеселленген пал хәррелер зыянсыздандырылады, пал хәррешиликте қолланылатуғын әсбап-үскенелер дезинфекцияланады. Кесел семьядан алынған өнім хәм шийки өнімлерди, бұйымларды пайдаланыу қадаған етиледі. Кеселленген семья сапластырылады (өртеп жибериледи).



Сүүрем: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Кеселликти емлеу ушын бир ампула апифлокс дәрисинен 3/1 сироп таярлап шириген нәсиллик рамкаларына себиледи хәм бул 3 күн дауамында исленеди, егер апифлокс жоқ болса 1/1 қатнаста қант сиропына 400-500 мың ЕД тетрациклин группасындағы антибиотик, 1-2 гр сульфаниламид препаратлары араластырылып кешки уақыт хәр бир семьяға 100-150мл ден бериледи. Дәри қосындысы азық науаларына ямаса соталы рамкаларға қуыйлады.

Пал хәрре семьясының ишки көлеми ысытылады, кириу-шығуы тесиги тарайтылады. Емлеуши азық 5-7 күн аралығында кесел семьялар тәуір болғанға шекем бериледи. Сау пал хәрре семьяларына да алдын алыу ушын кесел семьялар тәуір болғанға шекем 1-2 мәрте емлеу азықлығы бериледи.




*Сүүрем:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүклөп алынды.*

Дизенфекция ушын тахтадан жасалған әсбап-үскенелер өртлі лампада күйдирилип дезинфекцияланады, униформалар 2% лы карбонат еритпесинде 30 минут қайнатылады, кеселленген уя рамкалары еритиледи, алынған пал пайдаланыу ушын шығарылмайды, пал хәррешиликте қолланылатуғын темир бұйымлар 2-3 % лы сирке кислотасы менен дезинфекцияланады.

3.2. Европа шириў кеселлиги

Кеселлик бәхәр мәүсиминде ҳаўа райының суўық ўақтында азық жетиспеўшилиги себебинен келип шығады. Бул пал хәрре семьяларының күшсизлениўи нәтийжесинде жүзеге келип, 4-7 күнлик аўзы ашық хәм жабық личинкалар кеселленеди. Кеселликти стрептококк Плутон тарқатса, екилемши микроорганизмлар сыпатында бацилла альвит, стрептококк апис, бацилла арифеуслар кеселликти күшейтеди. Бөлме температурасында қурғақ личинкаларда стрептококк 17 айға шөкөм, пал хәрре семьясындағы соталы рамкалар хәм палда 1 жылға шөкөм; қуяш нурында кептирилген стрептококк 21-31 саат ишинде; суўда 5-6 саат; палда 3-4 саат; 2 % лы карбол кислотасының 1 м3 да 40°C та 3 саат өткеннен кейин набыт болады. Жумысшы пал хәррелердин личинкалары төртинши күннен баслап кеселликке шатылады. Инкубация дәўири 1,5-3 күн даўам етеди. Кеселленген семьядан саў семьяларға жуғады. Соның менен бирге кеселликти уры пал хәррелер хәм басқа пал хәрре хожалығына ушып кететуғын көшпели пал хәррелер тарқатады.



сайтынан жүклөп алынды.

Кеселликтиң клиникалық белгилери-пал хәрре семьясында шириген личинка ушырасса онда шаңарақ күшсиз кеселленген болады. Егер семьядағы ашық личинкалардың 10-25% ширий басласа, онда шаңарақ күшли кеселленген саналады.

Бундай жағдайда кеселленген личинкаларды аўзы бастырылған соталарда да ушыратыў мүмкин.

Жылтыр ақ реңдеги саў личинка

кеселленсе, ол сарғая баслайды хәм ширийди. Кеселленген личинкалар өлгеннен соң гүңгирт хәм қоңыр түске киреди. Кеселленген личинкалар ининде бир орында турмай, өз орынларын өзгертип, соталардың шетинде, дийўалларында хәр түрли көринисте жабысып қалады. Айырым жағдайларда шириген личинка тап Америка шириў кеселлигине уқсас созыла баслайды, лекин қысқа-қысқа созылады. Ширеген личинкалардан ашқылтым алманың ийиси ямаса сасыған гөштиң ийиси келеди.



Сүүпет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl
сайтынан жүклөп алынды.

Диагноз-саў личинкалар арасында 3-6 күнлик ашық личинкалардың, гейде жабық сотадағы личинкалардың кеселленгенин ушыратыў ямаса ашқылтым шириген гөш ийсиниң келиўи хәм ашық личинкалардың ининде хәр түрли жағдайда жатқанын ушыратыў мүмкин. Қандайда бир семьяда

кеселлик бар екенлиги сезилсе, онда хэмме пал хәрре семьялары тексерилип кеселленген семьялар анықланады хэм кесел семьялардан, соталы рамкадан хэм кеселленген личинкасы бар соталардан үлги алынып лабораторияға жиберилип, сол нәтийжелер арқалы диагноз қойылады.

Алдын алыу хэм қарсы гүресийү-пал хәрре хожалықларында тек сау, күшли, жоқары өним беретугын семьяларды услап оларды көбейтиу зәрүр. Әсте рауажланып атырған, кеселленген хэм нәтийжесиз қыслап атырған семьяларды сапластыруу керек. Хәр бир пал хәрре семьясын ерте бәхәрден 10-12 кг азық хэм 2-3 соталы рамкада гүл шаңы менен тәмийинлеу зәрүр. Айырым районларда уақты-уақты менен нектар ажыратыушы өсимликлер болмаған жерлерде нектар ажыратыушы өсимликлер егилип, пал хәррелер азық пенен тәмийинленеди ямаса нектар бар орынға көшириледі.

Енди кеселленген пал хәррениң ишки көлеми қысқартылады, ысытылады, пал хәррелер тап Америка шириу кеселлигиниң емлеу усылына уқсап емленеди. Бул кесел менен кеселленген пал хәрре семьясы бар пал хәррешилик хожалығына «Карантин» жазыуы орнатылады, пал хәррелер тәуір болғанға шекем емленеди.



Кеселленген пал хәрре семьялары басқа таза ямаса дезинфекцияланған уяға көшириледі. Соталы рамкалар орнына сау семьядан рамка алып келип қойылады ямаса тек воциналы рамка бериледи. Ана хәрре орнына сау семьяда өсирилген аналық хәрре қуыршағы ямаса жупласқан аналық хәрре бериледи. Гүзде күшли пал хәрре семьяларында сол кеселлик бар екенлиги анықланса, пал хәррелерди таза ямаса

тазаланған уяға сау семьядан палы бар рамкалар алып келип қойылғаннан кейин көшириледі. Кеселликти емлеуде Америка шириу кеселлигинде қолланылған антибиотиклерден пайдаланылады.

Пал хәррелердиң уясы, рамкалар, жабыуша, нектар ыдысы, аналық хәррениң қәпеси хэм басқа әсбап-үскенелер пал хәрре көширилгеннен кейин жақсылап дезинфекцияланады. Оннан алдын уя хэм рамкадағы мум қалдықлары, прополислер тазаланады. Ағаштан хэм темирден жасалған әсбап-үскенелер 1% кир жууыу унтағында ямаса 2% күл силтисинде (щелочь) дезинфекцияланады. Халатлар қайнаған сууда қайнатылып дезинфекцияланады. Өлген личинкалары бар соталы рамкалар гүл шаңлары менен бирге еритиуге тасланады. Бос соталы рамкалар 4% формалин еритпесинде ямаса 4% хлорамин еритпесинде 3 саат дауамында; 2% хиназол суйықлығында 30 минут дауамында дезинфекцияланады.

3.3. Септицимия

Кеселлик пал хәрре шаңарақларын бағыу хэм күтим бериу шәраятлары қолайсыз, жаман болыуы нәтийжесинде жүзеге келеді.

Кеселленген семьяда үлкен жастағы пал хәррелер өле баслайды. Кеселликти аписептикум жылдам спора пайда етпейтуғын таяқ сыяқлы бактериялар тарқатады. Бәхәр, жаз, айырым жағдайларда гүзде де кеселлик тарқалып үлкен жастағы пал хәррелердің өлиуі бақланады. Жоқары ығаллықта яғный бәхәр хәм жазда жаўын-шашын күнлери ығаллықтың семья ишине өтиуі, пал хәрре хожалығының аўлақ, салқын, ызғар орынларда жайласыуы, ал қыста семьяда суйық палдың болыуы септицимия кеселлигиниң раўажланыуына алып келеди.

Бул кеселлик қозғатыушысының спора таяқшалары 73-74°C қа шекем қыздырылса 30 минут даўамында өледі. 100°C та қыздырылса 3 минут даўамында өледі; қуяш нуры хәм формалин пуўында бактериялар 7 саатта өледі. Қуяш нуры астында өлген пал хәрре денесіндеги бактериялар 1 ай ишінде өледі.



Сүўрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl
сайтынан жүклеп алынды.



Сүўрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl
сайтынан жүклеп алынды.

Кеселликтиң клиникалық белгилери-

кеселленген пал хәррелер тынышсыз хәм басқыншы болып кеселлик жүдө тез раўажланады. Пал хәррелердің қаны (гемолимфа) сүтке уқсап ағарып кетеди хәм бир неше саат өткеннен пал хәррелер өле баслайды.

Өлген пал хәррелердің тоқымалары демде шашыла баслайды. Көкирек қөпеси сарғайып, қоңыр реңнен қаралау түске енеди. Өли пал хәрреге әсте тийсеңиз ол жеңил бөлеклерге бөлинип кетеди.

Диагноз-бул кеселликке жүзеки диагноз пал хәррениң сыртқы көринисине қарап қойылады. Кеселленген пал хәрре ямаса жақын аралықта өлген пал хәрре қаны (гемолимфасы)нан тексеріу ушын үлги алынады. Кеселликтиң соңғы диагнозы пал хәррениң қанынан септицимия кеселлигин қозғатыушы аписептикум бактериясы табылғаннан соң қойылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-пал хәрре семьясында септицимия кеселлиги бар екенлиги анықланғаннан кейин, кеселленген пал хәрре семьясы қурғақ уяға көшириледі хәм ишки көлеми тығыз етип қысқартылады хәм суйық палы бар соталы рамкалар семьядан алып тасланады. Семьяның ишки көлеми қысқартылып, қурғақ зат пенен қыздырылады.

Ал, бәхәрде пал хәрре семьялары бийиклеу орынға жайластырылады. Пал хәрре семьясына қойыу пал ямаса 67% лы 1 литр қант сиропына 300 мың бирлик тетрациклин ямаса биомидин дәріси қосып бериледи.

Кеселликти емлеу ушын пал хәрре хожалығын қурғақ жерге жайластырыу, уяның төбесинен ызғар өтпейтуғын етиу, хәм пал хәрре семьясының жақсылап ысытылыуын тәмийинлеу керек.

3.4. Қалташа тәризли личинка

Вириуслар арқалы шақырылатуғын жуқпалы кеселлик. Ашық үлкен жастағы личинкалар хәм қууыршақлары кеселленип өле баслайды. Өлген личинкалар дорбаға суу салып асып қойған көринисти еслетеди. Бул кеселлик жүдә кем ушырасады хәм өзлигинен сауалыу жағдайлары да ушырасып турады. Филтрленетуғын вируслар кеселликти тарқатады. Вируслар 50°C ыссы сууда 10 минут, пал ямаса глициринде 70-73°C 10 минутта өледи. Қурғақ бөлме температурасында 3 хәптеге шекем жасауы мүмкин. Қурытылған вируслар қуяш нуры астында 4-7 саат ишинде өледи. Жарық бөлмеде вирус пал ишинде 1 айға шекем сақланады. Үлкен жастағы пал хәррелердин денесинде пүткил қыс дауамында кейинги бәхәрде жаңа личинкалар пайда болғанға шекем жасайды. Бул кеселлик пенен көбирек 5-6 күнлик личинкалар кеселленеди, бирақ үсти жабық индеги личинкалар да кеселлениуи мүмкин. Кесел личинкаларды бағыу уақтында үлкен пал хәррелер тәрeпинен пал хәм гүл шаңы арқалы тарқалады. Уя ишинде жұмыс ислеуши жас жұмысшы пал хәррелер соталарды тазалау, өлген личинкаларды шығарып таслау уақтында, личинкаларды бағып азықландыруу уақтында кеселликти жуқтырады. Уядағы жас пал хәррелер кеселликти тарқатыушы болып, өз уясындағы хәм қоңсылас уялардағы личинкаларды да кеселлендиреди.



Сүурет:

*https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl
сайтынан жүклеп алынды.*

Кеселликтің клиникалық белгилери- кеселленген личинкалары бар соталы рамкалардағы личинкалар арасында түрли көринисте шириу кеселлигине уқсас өлген личинкалары бар соталар көп болады. Иннің үсти ашылған ямаса бийтәртип жабылған болады. Үсти жабылған личинкалар өле баслайды. Жұмысшы пал хәрре, еркек хәрре, аналық хәрре личинкалары кеселлениуи мүмкин.

Айрықша тәсир қалдыратуғын ийис ажыратпайди. Кеселленген личинкалардың реңи қоңыр болады. Өлген личинкаларды сотадан алмақшы болсаңыз аңсат алынады. Өлген личинкалар қурып қалыуы ўақтында жыйрылып, бүгилип бас (тери) бөлеги көтерілип турғаны ушын тери қабығы буралып, әжептәуір қуўыршаққа уқсап қалады. Орта Азияда апрель хәм 15-майға шекем, ал Россияда май, июнь айларында кеселлик басланады, гейде июльда да ушырайды. Күшли пал алыў мапазында кеселлик азаяды ямаса пүткиллей болмайды. Узақ ўақыт жаўын жаўыуы температураның төменлеп суўып кетиўи, тәбиятта нектардың



Сүўрет:

https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүклеп алынды.

болмаўы кеселликтің тарқалыўына себепши болады.

Диагноз-кеселликти микроскоп астында тексерип, оны тарқатыўшы организмлерди өлген қурғақ пал хәррелерде көриў мүмкин емес. Бактериологик тексерийлерде жақсы нәтийже бермейди. Өлген қалташалы личинкалар иннен тез ўзилиўи, шириген личинканың созылмаўы, айрықша ийис ажыратпаўы менен бул кеселлик

Америка шириў кеселлигинен парықланады. Личинкалардың аязлаўы нәтийжесинде соталы рамкалардағы хәмме личинкалар өлгенде шириў хәм қалташалы личинка кеселлигинде рамкада алалаў түстеги личинкалар кеселленеди.

Алдын алыў хәм қарсы гүресий- пал хәрре хожалығындағы күшли пал хәрре семьяларын керегинше пал азығы хәм де гүл шаңы менен тәмийинлеў зәрүр.

Семьяның ишиндеги соталы рамкаларды жаңалап, ана хәррени жақын әўлад еркек пал хәррелер менен қосылыўына жол қоймастан, тез-тез пал хәрре әсбап-үскенелерин дезинфекциялап турыў усыныс етиледі. Пал хәрре семьяларына 50мг биомицин ямаса 50% лы левомецетин дәрисинен 1 литр қант сиропына қосып бериледи.

Толық саўалғанға шекем пал хәррешилик хожалығына «Карантин» жазыўы қойылады. Кеселленген семьядағы аналық хәррениң мәйек қойыўын тоқтатып турыў мақсетинде оны 5-7 күн сым тор қәпеске қамап қояды, кейин бул семья аналық хәрреси басқа саў семьяда өсирилген аналық хәрре менен алмастырылады. Күшли кеселленген личинкалы рамкалар семьядан алып тасланып, орнына саў семьядан личинкалы рамкалар хәм сапалы бос соталы рамкалар қойылады.

Кеселленген семьяға көшпели пал хәррелерин қосыў жақсы нәтийже береді. Буннан тысқары, кеселленген пал хәрре семьялары жақсылап күйдирилген таза уядағы воцина жабыстырылған рамкаларға көширилсе қағыйдаға муўапық болады.

3.5. Паралич (ләң, мешел)

Бул үлкен жастағы пал хәррелердің өлими менен жуўмақланыўшы жуқпалы кеселлик болып, кеселликти фильтрлениўши вирус тарқатады. Кеселлик тарқатыўшы вируслар онша шыдамлы емес, сол себепли 93°C қа шекем қыздырылғанда 30 минутта өледі. Вирус пал хәррелер ушын жуқпалы саналады. Кеселликтің раўажланыўына күтилмеген суўық ҳаўа ағымы, жаўынлы ҳаўаның ыссы ҳаўаға алмасыўы хәм белок жетиспейшилиги себеп болады.



https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl_saytynan_juklep_alindy.

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерістер (клиникалық белгілер)- кеселленген пал хәррелер алдын жүдә тынышсызланып, тез алға умтылады хәм орнында айлана баслайды, дауыс шығарады. Кейин олар тынышланып, сыртқы тәсірлерге итибар бермейди, өзлерин қорғамайды, қыйыншылық менен орынларынан озғалып, хауаға көтеріледі хәм қулайды. Жығылғаннан кейин, бираз уақыт қыймылдамай жатып, тийсеңіз өсте қанатын қыймылдатып, кейин

набыт болады. Кеселленген пал хәррелердің түклері түсіп, жылтырап, тап майланғандай көринисте болады.

Кеселликтің жедел өтіу дәуірінде көп үлкен жастағы пал хәррелердің набыт болыуы бақланса, созылмалы (хроник) кеселлик дәуірінде пал хәррелер 30-40 күн өткеннен соң өле баслайды хәм кеселликтен өліп атырғанлығы сезілмейди, негизінде пал хәррелер өзлери қартайып өліп атырғандай түйіледі. Кеселликтің тарқалыуына ыссы хауада гүл шаңы жетіспеушілігі себеп болады.

Диагноз-вируслы ләң кеселлигине пал хәррелердің сыртқы көриниси хәм хәрекетлерине қарап хәм биологиялық пробалар тийкарында диагноз қойылады. Биологиялық пробада үйрениу үшін 10-20 кеселленіп өлген пал хәррелерді алып, оны ылай ыдыста хәр бир пал хәрре есабына 1мл тазаланған (дистилленген) суу хәм 0,25мл 4 рет хлорлы углерод қосып, жақсылап езіледі, хәм 2 мәрте музлатып, еритілгеннен кейин центрифугада шөгінділері шөктирилгеннен кейин, жиңишке ийне жәрдемінде сау пал хәрре денесинің 2-3-қарын сақыйнасы арасына абайлап жиберіледі. Қадағаланыушы сау семьядағы пал хәрреге тап сондай жол менен физиологиялық араласпасы жиберіледі. Тәжірийбедегі астындағы пал хәррелер вируслы ләң кеселлигіннен 3-4 күн өткеннен соң набыт болады. Сол фильтрленген суйықлық тәжірийбедегі пал хәррелерге қант сиропына қосып берілсе, онда пал хәррелер 10-12 күн өткеннен кейин набыт бола баслайды.



Сүүрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyl_saytynan_juklep_alindy.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-ләң вирусына қарсы емлеу дәрілері жоқ. Айырым жағдайларда аммиак спиртинің, яғный нашатыр спиртинің пайдасы тийген уақытлар болған. Кеселликтің алдын алыу мақсетінде ләң кеселлигине гүман тууылса, онда 10-15- майдан баслап хәр 10 күннен 4 мәрте хәр бир семьяны 50мг рибонуклеазаға 15 мл салма ямаса қудық сууын араластырып сеуіп турылады. Дәрілеу жұмыстары кеште ушыушы пал хәррелер атыздан қайтқаннан кейин алып барылады. Сондай-ақ,

антибиотиклерден пеницилин, биовиттен де пайдаланыу мүмкін, бірақ олардың пайдасы азырақ болады. Хәзіргі шыққан антибиотиклерді қолланыу үшін инструкциясынан пайдаланыу ұсыныс етіледі.

3.6. Аскосфероз

Жуқпалы кеселлик болып еркек хәм жұмысшы пал хәрре личинкалары



Сүӱрем: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

өлип, хәкке уксап қатқан жағдайға айланады. Кеселликти перицистоз апис замаррығы тарқатады. Бул замаррықлар шар формасындағы споралардан ибарат болып, көлеми 6,6 мкм жуқа қабық пенен қапланған болады. Аскосфероз замаррығы 3-4 күнлик пал хәрре

личинкаларына тән болған хәм замаррық споралары личинкалар ишине түскеннен соң төмен температурада жақсы раўажланады. Семья ининиң шетлериндеги соталардағы еркек пал хәрре личинкалары көбирек кеселленеди. Кеселликти аўырыў пал хәррелер хәм өлген личинкалар тарқатады. Бағыўшы пал хәррелер личинкаларды азықландырыў барысында азықлық арқалы кеселликти тарқатады.

Кеселликтің клиникалық белгилери-тийкарынан күшсиз пал хәрре семьялары хәм сол семьядағы соталардың төменги бөлегиндеги еркек пал хәрре личинкалары кеселленеди. Еркек пал хәрре личинкалары қатарында жумысшы пал хәрре личинкачалары да кеселленеди. Кеселленген личинкалар сотаның үстин жаўмастан алдын ақ пилис пенен қапланады хәм сотаның үстин жабыў ўақтында ақ пилис сотаны тесип өсип үлкейедил. Өлген личинка қурғап қатып қалады.

Диагноз-диагноз кеселликтің клиникалық белгилери хәм лаборатория тексеріўлери арқалы қойылады.

Кеселликти алдын алыў мақсетинде семьяны күшейтип, қыздырыў көпшиклери менен жақсылап орап ысытылады.

Кеселликке қарсы гүресіў илажларын алып барыў ушын семьяның ишки көлеми илажы барынша қысқартылады, кеселленген личинканы соталы рамкалардан ажыратып алып, семья жақсылап ысытылады. Күшсиз пал хәрре семьялары бир-бирине қосып жибериледи.

3.7. Аспергиллөз



Сүӱрем: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Пал хәрре семьяларының жуқпалы кеселлиги болып пал хәрре семьяларындағы личинкалары қурғап өледі хәм үлкен жастағы пал хәррелер де зыян көреді.

Қатып қалған личинка замаррығы адам хәм үй хайўанлары ушын да қәўипли. Пал хәрре семьялары орнатылған

жерде ығаллық жоқары болыўы, көп гүл шаңының алып келиниўи хәм жаўынның көп жаўыўы кеселликтің тарқалыўына себеп болады.

хәррелердің дем алыуы тезлесіп, қарын шеңберлері тез-тез қысқара бастайды, кейнінен олар күшсізленип, уя хәм сота дийуалларынан сырғанап түсіп кете бастайды. Кесел пал хәррелер уя ишінде ямаса алдында өледі. Олар уядан ушып шығып, жән-жаққа өріп кетеді. Бундай жағдайларда кесел екенлігін байқамай қалыу да мүмкін. Кеселленген пал хәррелердің қарын бөлегін бармақ менен езгенде оның қарны қатты болып қалады.

Диагноз-аспергиллөз кеселлігін өлген личинка хәм пал хәррелердің сыртқы көринісіне қарап, хәм микроскоп астында тексеріулерге тийкарланып диагноз қойылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-пал хәрре уясы құрғақ, ызғар болмаған, қуяш нуры жақсы түсетуғын жерлерге жайластырылады. Пал хәрре хожалықтарында күшли пал хәрре семьяларының ишки көлемін қысқартып жастықшалар менен жақсылап ысытып услау керек. Кеселленген пал хәрре семьяларынан ауырыу личинкалары бар соталы рамкалар хәм пиісленген рамкалар алып тасланады. Соталы рамкалар пал хәррелер менен биргелікте тазаланған құрғақ уяға көшіріледі. Уядағы хәмме қыздыруу жастықшалары хәм жабыушалар өзгертіледі. Семья жеткілікті пал азығы менен тәмийінленеді. Егер пал азығы болмаса, онда 60-70% лы қант сиропы менен азықландырылады. Күшсіз пал хәрре шаңарақтарының ишки көлемі илажы барынша қысқартылады, үсті хәм қаптал төрепінен ысытылады.



Сүйрем:https://pikabu.ru/story/bole_zni_rchyol сайтынан жүктеп алынды.

Кеселлікті емлеу үшін аспергиллөз замаррықтарына қарсы сарымсақ пияздан (чеснок) пайдаланыу мүмкін, апимакс бальзамы да бул кеселлікке қарсы қолланыуға болатуғын құрал саналады, нистатин унтағының 40 граммын 1 кг қумшекерге араластырып, алмұрт формасындағы резина бүркегіш (пульверизатор) жәрдемінде кеселленген личинкалы рамкалар хәм пал хәррелерге себиледі. Бүркіу жұмыслары кеселліктен тәуір болғанға шекем хәр 5-7 күн аралығында дауам еттиріледі.

Бәхәрде пал хәррелерге хауа райы қолайсыз жерлерде қант сиропына асковит қосып беріледі.


Жазда температура 15°C тан төмен болғанда рамкалардағы пал хәррелерге хәм личинкаларға асковит сеуіп емленеді.

3.8. Меланоз

Аналық хәррелерде ушырасатуғын кеселлік болып, туқымлығы қарайып, дәрет шығарыу жолында **замаррық рауажланып** турып қалыуы хәм оның мәйек қойыуды тоқтатыуы менен характерленеді.

Кеселлікті-Aureobasidium (син. Melanosella mors apis) әуладына

тийисли ашытқыға жақын замаррықлар түрине киретуғын гифомицетлер қатарындағы демациевлер семьясына киретуғынлар қоздырады.



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүкпел алынды.

Кеселликтің раўажланыўына пал хәррелерди азықландырыўдың сапасының төменлеўи, падь палын жеўи хәм басқа сапасыз азықлық дереклери себеп болады. Кеселлик пал хәррелер денесиниң механик жараланыўынан да раўажланыўы мүмкин.

Кеселликтің клиникалық белгилери- кеселлик тийкарынан жаз мәўсиминиң екінши ярымында басланады. Кеселлик басланыўында жупласқан аналық пал хәррелер дәслеп мәйек қойыўды кемейтеди, кейин пүткиллей тоқтатады. Кеселленген семьяларда мәйек хәм жас

личинкалар болмайды. Кеселленген аналық хәррелер хәрекетшенликти азайтып, босаң жағдайда узақ ўақыт хәрекетсиз қалып, жансыз қалғандай соталардан аңсат ўилип, уя түбине қулайды. Аналық хәррениң қарны қалыңласып, созылып, сүйретилген жағдайда болып, анал тесигинен қатқан тосық көринисиндеги дәрет шығып турады.

Күшсизленген хәм соталы рамкалардан түсип кеткен аналық хәррениң өлимин күтпестен жумысшы пал хәррелер оны уядан шығарып таслайды. Кеселленген аналық хәррени уядан онша узақ болмаған жерде 5-10 жумысшы пал хәррелер менен бирге ушыратыў мүмкин. Бундай аналық хәррени уяға қайтарып алып келиўден пайда жоқ, себеби пал хәррелер оны тағы уядан шығарып таслайды.

Аналық хәрреден айрылған семьялар өзлерине аналық хәрре таўып алмайды, себеби аналық хәрре мәйек қойыўды тоқтатқаннан баслап оны уядан шығарып таслағанға шекем бир хәпте ўақыт өтеди. Уяда жас личинкалары қалмағанлығы ушын олар өзлерине аналық хәрре таўып алмайды.



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүкпел алынды.

Меланоз кеселлиги пал хәрре семьяларының трутовка (яғный жумысшы хәррелер өзлери мәйек қоя баслайды) жағдайына түсиўине тийкаргы себеп болады. Жумысшы пал хәррелер де меланоз бенен кеселленип набыт болады.

Диагноз-дәслепки диагноз пал хәрре семьясын тексергеннен кейин қойылады. Егер семья ишиндеги соталарда мәйек хәм личинкалар болмаса, ана хәррениң қарны исип, анал тесигинен тосық көринисиндеги дәрет шығып турса хәм аналық хәрре кем хәрекетленип, зорға жүрсе, онда меланоз кеселлигине гүманланса болады. Аналық

хәррениң қарын бөлеги ашылғанда туқымлығы, безлери хәм ишеклериниң

қарайғанлығы да меланоз бенен кеселленгенен дәрек береді. Микроскопик тексеріуде тоқымаларда кеселликти қоздырыушылар табылса, соңғы диагноз аналық хәррениң туқымлығында қара дақлар бар екенлиги анықланса хәм олардан кеселликти тарқатыушылар табылғанда ғана қойылады.

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-пал хәрре семьяларын бағыу хәм күтім бериу шараятлары жақсыланады. Қыслауға қалдырылған азылық дерегинен сапасыз паллар алынып, гүл палына яки қант сиропына алмастырылады. Мәйек қойыуды тоқтатқан ана хәрре мәйек қоятуғын ана хәрреге алмастырылады.

4. Паразитли (инвазив) кеселликлер

4.1. Варроатоз



Сүўпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol_saytynan_juklep_alynydy

Жуқпалы паразитли кеселлик болып, Якобсон кенеси арқалы тарқалады. Бул кене хәзирде варроа деструктор деп аталады. Кеселлиги Республиканың хәмме аймақларында хәм басқа мәмлекетлерде де көп тарқалған, пал хәррешиликке күтә үлкен зыян жеткереді. Барлық пал хәррешилик қәнигелери, зоотехник хәм ветеринария врачлары кенениң раўажланыу жағдайы хәм оларға қарсы гүресіу илажларын билиуи керек.



Сүўпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol_saytynan_juklep_alynydy

Варроа кенесиниң реңи қоңыр болып, әпиўайы көзге көринетуғын аўыз аппараты жәрдемінде сорыушы паразит, кенениң төрт жуп аяғында денеге жабысып алыушы қурылмалары бар. Тийкарынан жумысшы пал хәрре, еркек пал хәрре, айырым жағдайларда аналық хәрре денесинде урғашы кенелер жабысып күн көреді, еркек кенелер болса урғашы кенелер менен пал хәрре сотасы ишинде қосылып (еркек пал хәрре соталарында)

жупласып болғаннан кейин, жумысшы пал хәрре ямаса еркек пал хәрре соталарында набыт болады. Урғашы кене денесиниң узынлығы орташа 1,1 мм, ени болса 1,7 мм, еркек кене денесиниң узынлығы 1,0 мм, ени 0,9 мм ге тең болады. Кенелердиң тийкарғы жабысып азықланатуғын орынлары пал хәррелердиң бас, көкирек хәм қарны ортасы хәм алдынгы 3 қарын сақыйналарының аралықлары есапланады. Бир жумысшы пал хәрре, еркек

пал хәрре ямаса аналық хәрре денесінде үштен беске шекем кене жасауы мүмкін.

Ворроа кенесинің тек урғашысы ғана қыслап шығады хәм жынысый жол менен жұмысшы пал хәрре, ана хәрре хәм еркек пал хәррелердің соталарында личинкалардың денесінде рауажланып көбейеди. Соталардағы личинкалар үстин жабыудан алдын урғашы кене сотаға кирип, сота дийуалларына ямаса личинкачалар денесине 3-8 данаға шекем мәйек қояды. Соталарға мәйек қойыу ушын бир уақыттың өзінде бир неше урғашы кене кириуі мүмкін. Кенениң мәйеги тап мәйек формасында, аппақ сүт реңде болады. Пал хәррелердің соталарына қойылған кене мәйегинен арадан 8-9 күн өткеннен кейин урғашы кене, 6-7 күн өткеннен кейин еркек кене жетилисип шығады. Урғашы кене еркек кене менен үсти жабық пал хәрре соталарында қосылады хәм жупласқан урғашы кенелер пал хәррелер сотадан шыққан уақытта олардың денесине жабысып, бирге шығады.



Сүүрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклегі

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерістер (клиникалық белгілер)-урғашы кенелер 22-25°C температурада хәуа ығаллығы 70-80% болғанда 5-6 күн дауамында аш жасауы мүмкін. Ишінде пал хәрреси жоқ уядағы қаралтым соталарда 6-7 күн, ашық личинкада 15 күн, жабық личинкада 32 күн, өлген пал хәррелер денесінде 3-5 күн, өли қуыршақ денесінде 7-11 күн жасай алады. Орта Азия регионьында урғашы кене 5 айдан 12 айға шекем хәм оннан көбірек уақыт жасауы мүмкін.

Үлкен жастағы урғашы кенелер пал хәрре (гемолімфа) қаны менен азықланып личинка, қуыршақ хәм үлкен жастағы пал хәррелердің денелерин толықтырып, белок кеселлигин рауажландырады, нәтийжеде пал хәррелердің дене тоқымаларының искерлиги бузылып, қанына гафниоз, Европа шириуі, паратиф сыяқлы жуқпалы кеселликлер бактерияларының жуғыуына себеп болады хәм еки түрли кеселликтің тәсиринде пал хәррелер набыт бола



Сүүрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклегі алынды.

баслайды.

Личинкалар денесіндегі қанды кенелер сорыуы нәтийжесінде қан азайып, белокқа иштей күшейгеннен кейин, пал хәррелер личинкаларды уя тесиги алдындағы тахташаға сүйреп алып шығып таслайды. Ворроатоз кенесинен зыянланыу үш басқышта өтеди: Биринши басқышта-кенелерден пал хәррелер 0,5-2% ке шекем зыян көреді хәм кене менен зыянланыу пал хәрре семьясының рауажланыуына онша тәсир көрсетпейди,

кенеге қарсы гүресиў жумысларын алып барыў жеңил кешеди.

Екинши басқыш зыянланыўда кенелер 3% дан 30% ға шекем қуўыршақлар, пал хәррелерди, еркек пал хәррелерди зыянлайды хәм бундай зыянланыўды емлеў хәм оның алдын алыў мүмкин.

Үшинши басқыш зыянланыўда пал хәррелер, қуўыршақлар, еркек пал хәррелер 30% дан артық зыян көргенде кенеге қарсы гүресиў қыйын болып, көпшилик жағдайларда пал хәрре семьяларының набыт болыўы бақланады.

Диагноз-пал хәрре уяларында жаз айының ақырында хәм гүз айларында кенелер көзге тез-тез тасланып, аңсат анықланады. Бәхәр хәм жаз айларында пал хәррелердің денелеринде, личинкаларда хәм пал хәррелер қонатуғын тахташа үстинде кенелерди ушыратыў мүмкин.

Ал, қыста уяның түбине төгилген патас шығындылар ишинде кенелер бар екенлиги көринип турады. Үлкен жастағы пал хәррелер хәм еркек пал хәррелер денесиниң 2-3-қарын сақыйналарының арқасында көбирек ушырасады.

Кенениң бар екенлигин анықлаў ушын байворол, бипин, маврика, флюцин, флюметрин сыяқлы дәрилердің бир түри менен бир мәрте дәрилеп, уяның астындағы вазелин сүртилген картон қағазға кенелердің түсиўине қарап билиў мүмкин. Егер пал хәрре хожалығында биринши мәрте ворроатоз кенеси бар екенлигин анықлаған болса, онда жақынырақ жайласқан ветеринария лабораторияларына өлген пал хәррелер, уяның астындағы патас шығындылардан 150-200 г есабында, тири пал хәрреден 200 г хәм сотаның төменги бөлегиндеги жумысшы пал хәрре ямаса еркек пал хәрре личинкасы бар соталардан 3-15 см қырқылып, фанерли кишкене тартпа ишине салып, жоллама хәм акт пенен бирге тексерийўге жибериледи. Жолламада кәрхана мөкан-жайы, пал хәррешилик хожалық жайласқан орын, пал хәрресин бағыўшының аты, фамилиясы хәм кеселлик қашан пайда болғанлығы жазылыўы керек.



Сүўпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_rchyol сайтынан жүклеп алынды.

Алдын алыў хәм қарсы гүресиў-зыянланбаған пал хәррелерди бөлек 15 км этирапында пал хәрреси болмаған хожалыққа алып барылады. Аналық хәрре хәм киши жаңа семьялар кеселленбеген пал хәрре хожалықларынан сатып алынады. Пал хәррешилик хожалықларында хәлсиз пал хәрре семьяларын бағыў усыныс етилмейди. Егер шеклеў қойылған пал хәррешилик хожалығында жайласқан орында, гүллеп турған гүл шаңын беретугын өсимликлер болмаса, онда белоклы азық пенен азықландырып турылады. Пал хәррешилик хожалығында пал хәрре уясы

қурғақ, самал есетугын қуяш нуры түсетугын орында жерден 30-40 см бийикликтеги қазықлар үстине орнатылады. Пал хәррешилик хожалығындағы әсбап-үскенелер хәм қолланылатугын буйымлар

дезинфекцияланып турылады.

Ворроатоз кенесине қарсы гүресіу жұмыстарын үлкен жастағы пал хәррелердің хәм личинкалардың денесіндеги кенелерди өлтириу жолы менен алып барылады.

Үлкен жастағы пал хәррелердің денесіндеги кенелерди жоқ етиу ушын пал хәррелер денесінде паразитлик етип атырған кенелер хәр түрли ийистеги уулы дәрилер жәрдемінде түсириледі.

Буған маврика, флюцин, флюметрин, байворал, байгикол дәрилеринен пайдаланылады. Хәзирги уақыттағы нәтийжели дәрилер: бисанар, қумырысқа кислотасы, щавель кислотасы хәм Россияда ислеп шығарылған АПИСТАНАЗОЛ аэразолы болып табылады. Үлкен жастағы пал хәррелердің денесинен кенелерди ыссылық камерасы жәрдемінде 47-48°C та түсириу мүмкин.

Үлкен жастағы пал хәррелердің кенесин бәхәр, жаз хәм гүз айларында азанда ямаса күннің екинши ярымында дәрилеп түсиреди. Хәлсиз пал хәрре семьяларын бир-бирине қосып, пал хәррелер қаптал хәм үстки тәрептен жастықшалар жәрдемінде ысытылып, уяның артықша тесикшелери ылай менен сыбап бекитиледи хәм уяның астына сым торлы рамка үскенеси ямаса майлы қағаз қойылып, дәриленеди. Дәрилеуден алдын пал хәрре семьясындағы соталар аралығын 1,5-2 см етип қойса, кенелер жақсы түседі. Кенелер уяның астына вазелин сүртип қойылған қағазға ямаса сым торлы рамкаға түседі. Кенениң тарқалмауы ушын пал хәррешилик хожалықларында көшке шығыудың алдын алыу хәм урлықшы пал хәррелердің басқа уяға кириуине жол қоймау илажларын ислеу усыныс етиледі.

Зыянланған пал хәрре семьяларын химиялық дәрилер менен дәрилеу уақытында дәрилейтуғын жұмысшылар зәхәрленбеуи ушын арнаулы кийимлерде, респираторлардан пайдаланып ислесе, дем алыу жолларына зәхәрли затлардың ийиси кирмейди. Дәрилеу жұмыстары питкеннен соң, кийимлерин шешип, ауызды жақсылап суу менен шайып, қол хәм жүзлер сабынлап жууылады. Барлық дәрилеу жұмыстары ветврач қадағалауы астында алып барылады.

Ыссылық камерасы жәрдемінде ворроатоз кенесин түсириу. Бәхәр хәм гүз айларында семьяда личинкачалардың жоқ уақытында фанер ямаса ағаштан жасалған ыссылық камерасы электр қууаты менен ысытылып, сым тордан исленген тор қәпес пенен тәмийинленген үскене жәрдемінде пал хәррелердің кенелери азанда ямаса кеште +12°C хәуа температурасында түсириледі. Бул жұмысты баслаудан алдын пал хәрре семьясынан аналық хәрре алынып, жұмыс питкенше Титов қәпесине салынып, ыссы жерде сақланады. Ал, пал хәррелер қаңылтыр воронка жәрдемінде сым торлы қәпеске силкип қағылады. Пал хәррелер салынған қәпестің есиги жабылып, соң 6-9 минут дауамында ыссылық камерасында сақланады хәм хәр 3-5 минут сайын тор қәпес силкип турылады. Ыссылық камерасындағы температура 46-48°C шекем көтериледи. Кенелери түскен қәпестеги пал хәррелерди өз уясы алдына апарып, олар тынышланғанша 3-5 минут қәпесте услап турылады хәм қәпестің есиги ашылып, пал хәррелер өз

уясына силкип қағылады. Аналық хәрре де семьясына қайтарылады. Усы тәрізде бір күнде 20-40 жабық қутыдағы пал хәррелердің кенесін ыссылық камерасында төгий мүмкін.

Ворроатоз кенесіне қарсы зоотехникалық гүресіу жоллары. Пал хәррелер денесінде паразитлик етип атырған кенелер хәр түрлі ийистеги зәхәрлі дәрилерден тысқары зоотехникалық жол менен түсириледі. Бунда ерте бәхәрден баслап пал хәрре семьясының ортасына еркек пал хәрреси бар соталы рамка қойылады. Сол қойылған соталы рамкаға аналық хәрре аталықсыз мәйек қояды. Урғашы ворроатоз кенелери сота дийуаллары ямаса личинкалар денесіне мәйек қояды. Пал хәррелер личинкалы соталардың үстин жапқаннан кейін, семьяға қосылған үлкен еркек пал хәрреси бар соталы рамканы алып, құяшта вощина еритиу үскенесіне тасланады ямаса ыссы пышақ пенен соталардың үстин кесип, ишіндеги личинкалар арнаулы ыдысқа қағылады хәм босаған соталы рамкалар қайтадан дәриленип тазаланады, кейининен тағы семьяға қойылады.

Буннан тысқары, хәр бір семьяның ишінде соталы рамкалар астына сым торлы поднос қойылып, соталы рамкалардағы пал хәррелерді қуяш нурында бір неше минут ушлап турып, соң уяның астындағы сым торлы поднос үстине силкип қағылады. Қуяш нуры тәсирінде тынышсызланып хәрекетленип атырған ворроатоз кенеси пал хәррелер сым тор үстине қағылғанда ол да төгилип, сым тор астына түседі. Сым тор астындағы поднос ишине вазелин ямаса май сүртип қойылса, ворроатоз кенелери өрмелеп кете алмайды.

Ворроатоз кенесін жұмысшы пал хәрре хәм еркек пал хәрре личинкаларында жоқ етиу. Ворроатоз кенеси менен жұмысшы пал хәрре хәм еркек пал хәрре личинкалары күшли зыянланғанда ерте бәхәрде еркек пал хәрре соталары бар рамкалар пал хәрре семьяларының аналық хәрреси мәйек қойып атырған орта бөлегіне қойылса, оған аналық хәрре мәйек қояды хәм еркек пал хәрре личинкаларының үсти жабылғаннан соң, еркек пал хәррели соталар кесип алынып, еритиуге тасланады. Семья ишіндеги 2-3 соталы рамкалардың төменги бөлеги, яғнай 4/1 бөлеги кесип алып тасланады хәм сол босап қалған бөлегіне пал хәррелер өзлери еркек пал хәрре соталарын тартып, еркек пал хәрре личинкаларын жетистиреди. Пүткил жаз мәүсими дауамында хәр 14 күннен, пал хәрре семьяларын тексеріу жұмысларын алып барыу уақтында рамкалардың төменги бөлегіне тартылған еркек пал хәрре соталарындағы личинкалардың үсти қырқылып, вощина еритиушиге тасланады; соталардағы личинкаларды төменге қаратып, бір ыдысқа қағып, личинкалар түсириледі хәм босаған соталар 3% сирке кислотасы еритпесінде шайылып, тағы қайтадан семьяға қойып пайдаланылады.

Ворроатоз кенесіне қарсы гүресіуде семья ишіндеги хәмме личинкалы рамкалар ажыратып алынып, кейін жоқарыда айтылған химиялық дәрилердің бирейи менен яки ыссылық қутысында емленсе, жақсы нәтийже береді. Семьядан ажыратып алынған личинкалы рамкалар бір күшли пал хәрре семьясына қойылып, 21 күн сақланғаннан кейін, бір химиялық дәри менен дәриленеди хәм олардың күшинен пал топлауда

пайдаланылады.

Тутып алынған пал хәррелер көшин дәрилеу. Тәбийй пал хәррелер көши ямаса жаңа таярланған семьяларды тәбияттан нектар шыққан ўақытта да дәрилеу мүмкин. Оның ушын тутып алынған тәбийй пал хәррелер ямаса ажыралып шыққан семьяларды 24 саат ишинде аш қалдырып, көшти услап турығаннан кейин ыдысты қатты шайқап ямаса бир мәрте қол менен урып, пал хәррелер қуты түбине түскеннен кейин, олардың үстине бир мәрте 50 мл таяр перицин маврика, флюцин, флюметрин, байворал, байтикол дәриси (дәрилердің еритпесин таярлауда дәрилердің аннотация бетинде жазылған көрсетпеге әмел етиледі) еритпесинен тамызылады. Енди пал хәррелердің көши ямаса жаңадан пайда болған семьяны бағыу хәм пал алыу жұмыстарын орынлау мүмкин.



Сүўрет: Google интернет сайтынан жүклеп алынды.

Перицин, маврика, флюцин, флюметрин, байворал, байтикол дәрилері менен ворроатоз кенесине қарсы гүресіу жұмыстары 5 мәрте хәр жети күнде ерте бәхәрде хәм бир күнде еки рет әмелге асырылады.

4.2. Акарапидоз



Сүўрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
сайтынан жүклеп алынды.

Кенелер үлкен жастағы пал хәррелердің дем алыу жолларының, трахеяларының функциясына зыян жеткереді. Қыста хәм бәхәрде пал хәррелердің күшсизленип өлиўине алып келеді. Алдын өсте тарқалып, кейин пал хәррешилик хожалықларына жүдә үлкен зыян жеткереді. Акарапис вуди кенеси үлкен жастағы пал хәррелердің трахеяларында қан сорып паразитлик етеді. Кенелер пал хәррелердің трахея дем алыу жолларында топланып, сол жерде қосылады

Кенелердің азықланатуғын жери биринши көкирек дем алыу

жоллары болып, бул жерге биринши көкирек дем алыу жолынан өтеди. Буннан тысқары, пал хәррелер қанаты астында да тарқалады, себеби бул жердеги хитин тоқымасы жумсақ болғаны ушын олар дене тоқымаларын тесип, қан менен азықланады.

Кенениң личинкалары да хитин тоқымасын тесіуіге бейим.



Сүӱпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_rchyol сайтынан жүклеп

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерислер (клиникалық белгилер) - сыртқы орталықта кене тез набыт болады. Өлген пал хәррелердің трахея дем алыу жолларында кенелер 5-6 күннен артық жасай алмайды. Өлген пал хәррелердің денесіндегі кенелер басқа пал хәррелер ушын қәуипли емес. Кене үлкен пал хәррелер, аналық хәрре хәм де еркек хәрре денесінде паразитлик етеди. Пал хәррелердің мәйеги личинкасы хәм қуыршағында кене бар екенлиги бақланбаған.

Семья рауажланыуы менен бир қатарда кене де рауажланып барады. Бир пал хәрре зыян көргеннен баслап пүткіл семья 50% зыян көриуіне арадан 3-5 жыл өтеди хәм усындай күшли зыянланыу себепли семьяда зыянланыу белгилери сезиле баслайды. Сол гезде пал хәррешилик хожалығындағы көп санлы пал хәрре семьялары хәм этираптағы қоңсылас пал хәррешилик хожалығындағы көп санлы пал хәрре семьялары да акарапидоздан зыян көреді.

Зыянланыу пал хәррелер көши хәм адасып басқа пал хәрре уясына кирип жүрген жумысшы пал хәрре хәм еркек пал хәррелер арқалы сау пал хәррелер семьяларына тарқалады. Зыянланған пал хәрре семьясы өзлигинен хеш қашан тәуір болмайды, тез набыт болады. Кеселлик созылмалы кешип, анық ямаса созылмалы жағдайға өтеди. Созылмалы



Сүӱпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_rchyol сайтынан

кеселлик бир неше жыл дауамында арнаулы тексеріулер жәрдемінде де анықланбай қалады. Кеселликтің анық көриниси бир қанша кеширек, семьядағы пал хәррелердің 1/3, ярымы хәм оннан көбірек бөлеги кеселлене баслағаннан кейин билинеди.

Диагноз-хәррелердің дем алыу трахея жолларынан микроскоп астында акарапидоз кенеси тауылғаннан кейин ямаса пал хәррелер трахеясы арқалы олардың қаны алынып, тексеріу процесінде алдын сарғыш, кейин қоңыр хәм соңында қара реңге өтеди. Хәр жылы бәхәрде пал хәррелердің биринши

ушыў күнлери пал хәрре семьяларында акарапидоз кенеси бар екенлигине тексерий өткериледи. Егер айырым пал хәрре семьяларының пал хәррелер ушыўға хәрәкет етпей уя алдында сүйретилип жүрсе, онда хәр 3-5 пал хәрре семьясынан 50 пал хәрреден алынып, ветеринария-бактериологик лабораторияға анықлаўға жибериледи.

Алдын алыў хәм қарсы гүресий- зыянланыўдың алдын алыў ушын саў пал хәррешилик хожалықларына зыянланған пал хәррешилик хожалықларынан пал хәрресин алып келмеў илажларын көрий хәм зыян көрген пал хәррешилик хожалықлары пал хәррелер бөлек бағылып олардан пал хәрре семьяларын, аналық хәрре сатыўды хәм көш болып шығыўға жол қоймаў керек.

Акарапидоз кенеси жүдә қәуипли болып, дәрилеген менен онша көп нәтийже бермейди. Дәрилегенде тек азғана пайда береді, сол себепли хәр жылы дәрилеў жумыслары бир неше рет қайтарылады. Егер пал хәррешилик хожалығындағы пал хәрре семьясында акарапидоз кенеси бар екенлиги лаборатория тексерийинде тастыйықланса, пал хәррешилик хожалығы пал хәррелер хәм 7 км этираптағы басқа пал хәррешилик хожалықларына карантин қойылады, егер пал хәррешилик хожалығында биринши рет акарапидоз кенеси бар екенлиги анықланса, онда кеселленген пал хәрре семьясы жоқ етиледі. Акарапидоз кенесине қарсы гүресий ушын фольбекс, эфир сульфанат, хлоробензилат, тедион дәрилериенен пайдаланылады.

Пал хәрреси семьясын дәрилеў ушын: фольбекстен 0,4 гр, толық дәрилеўге (яғный хәр жети күннен сегиз мәрте) 3,2 гр эфир сульфонаттан 0,3 гр, толық дәрилеўге 2,4; тедиондан 1 гр толық дәрилеўге 10 гр сарпланады. Дәрилеўден алдын пал хәрре семьясынан артықша соталы рамкалар алынады хәм пал хәрре семьясының ишки көлеми уяның ортасына топланып, еки қаптал тәрәпинен тахташа менен тосылып, үсти хәм қаптал тәрәплери қағаз бенен бекитиледи. Уяда артықша тесикшелер болса, ылай менен сыбап бекитиледи. Пал хәрре киретуғын тесикшелер 2-

7 смге шекем қысқартылады (хәррениң күшине қарай). Хәмме пал хәрре семьялары бир тегис май айынан баслап сентябрь айына шекем дәриленеди.

Тедионның 1 грамм таблеткасын темир белшеге жағып қойып түтеткен халда пал хәрре киретуғын тесиктен киргизиледи хәм бундай дәрилеў жумыслары күн ара 10 мәртеге шекем қайтарылады. Дәрилеў жумыслары тамамланғаннан соң арадан 1 ай өтип, сол кеселленген пал хәрре семьясынан 50 пал хәрре алынып, лабораторияға тексерийге жибериледи. Егерде кене бар екенлиги тағы анықланса, ол халда дәрилеў жумыслары қайтадан басланады.



Сүўрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_rchyol сайтынан жүклеп алынды.

4.3. Браулёз



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Браула аналык хәрре хәм жумысшы пал хәррелер денесинде паразитлик етеди. Браулацеканың үлкен жастағылары қанатсыз болып, узынлығы 1,3 мм, кеңлиги 1 мм, қалың түклер менен қапланған болады.

Брауланың басы жалпақ, үлкен үшмүйешли, төс бөлеги қысқа, кең, қарын бөлеги бираз иймейген бес буыынлы, ауыз аппараты сорыушы болып, жоқары ерин хәм жақ сезиушилери бар, түкшелер менен қапланған төменги ерни зорға билинеди. Ауыз органлары бирлесип,

тумсық пайда етеди.

Сүрөт: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп алынды.

Кеселлик ақыбетинен жүзеге келген өзгерислер (клиникалық белгилер)-браула кенеси пал хәрре денесин кемирип, оның қаны (гемолимфа) менен азықланады.

Кене тийкарынан аналык хәрре хәм жумысшы пал хәррелердің көкирек бөлегине жабысып жасайды. Ол аналык хәм жумысшы пал хәрре азықлығы менен азықланады. Урғашы кене палы бар соталардың үстине жабылған воцинасы астына ямаса личинкалы соталардың үстки бөлегине айырым жағдайларда бос соталарға мәйек қояды. Мәйектен узынлығы 0,8 мм личинка шығып, ол уақыт өтиуи менен 2 ммге жетеди. Брауланың личинкасы сотадағы гүл шаңы, пал, мум хәм айырым жағдайларда қуыршаққа айналып атырған жумысшы пал хәрре личинкасы менен азықланады. Палдың үсти бекитилген воцина астында брауланың личинкасы өзине жол ашады хәм сол жолдың ақырына барғанда қуыршақ орайды. Үлкен кене арадан 18-28 күн өткеннен кейин (орта есапта 21 күн) қуыршақтан шығады.



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклөп

Диагноз – палы бар соталардың үстине жабылған воциналар өткір ыссы пышақ жәрдемінде қырқылып суўлы ыдысқа салынып бир неше мәрте аўдарылса браула суўға түседи. Браула кенеси бар екенлигине пал хәррелер хәм аналык хәрре денесиндеги кене көринисине қарап диагноз қойылады (әпиуайы көз бенен көриу мүмкин).

Алдын алыу хәм қарсы гүресию-кеселлик

тарқалыуының алдын алыу ушын пал хәррешилик хожалығындағы пал хәррелер толық тәуір болмағанға шекем карантин орнатылады. Пал хәррелер денесиндеги кенелер үзликсиз жоқ етилип барылады. Кенениң

мәйеги, личинкасы хәм қуыыршақлары май хәм июнь айларында үзликсиз түрде палы бар соталардың үстине жабылған вощиналарды кесип барыу арқалы жоқ етиледі. Қырқылған вощиналар мум алыу ушын еритиледі. Үлкен кенелер фенотиазин, тедион хәм фольбекс жәрдемінде түсириле



Сүрөт: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүкпел алынды.

4.4. Тропилапсоз

Пал хәрресиңиң кенеси болып пал хәррелер нәсилиңиң паразитлери класына киреди. Пал хәррелер личинкалары хәм қуыыршақлар менен азықланыуы нәсилдиң раўажланбауына, пал хәррелердиң өлимине хәм пал хәрре семьясының азайыуына алып келеди. Кене раўажланыуы шама менен 1 хәпте даўам жетип, пал хәррелерге тарқалады. Тропилапсоз түринде кеминде төрт түри бар. Хәр бир түри пал хәрреси менен байланысly. Еки түри (*T. clareae* ва *T. mercedes*) Апис меллифера пал хәррелерге үлкен зыян жеткереди. Қалған еки түри (*T. koenigerum* и *T. thaili*) А. меллифера ушын зыянсыз болады.



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүкпел алынды.

Кеселликтиң клиникалық белгилери-тропилелапстың жуғыуы
көплеген личинкалардың өлимине себеп болады (50% шекем), бунда көплеген вощинадан бир бөлеги шығып турған өли нәсиллерди бақлау мүмкин. Деформацияланған хәррелерди (қарынлары деформацияланған, келте қанатлары, аяқлары деформацияланған ямаса улыўма оларсыз) көриу мүмкин. Базы зыянланған хәррелер уяның кирер жерине қарай ембеклейди.

Буннан тысқары, зыян көрген пал хәррелер личинкаларын ямаса жас пал хәррени шығарып тасланғанын, исши хәррелер төрепинен соталарды тазалау нәтийжесинде соталардың

қақпағында пайда болған тесиклерди көриў мүмкин. Айырым зыянланған пал ҳәррелер ушып, кенени басқа пал ҳәрре семьяларына жуқтырады.



Сүўрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pch
yol сайтынан жүклеп алынды.

Диагноз-хәр бир түрин анықлаў ушын молекуляр хәм морфологиялық усыллар бар. Тропилаелапсдан зыянланыў тәсирлерин пал ҳәррелерде визуал түрде ямаса уядағы патаслықты тексерий арқалы анықлаў мүмкин. Өлик ямаса тор сыяқлы ала-була нәсилдин бар екенлиги, уяға кирий ушын еңбеклеп жүрген хәлсиз, қанатсыз пал ҳәррелер хәм әсиресе, көплеген соталарда тез жуўырып жүрген қызыл-қоңыр, узын *Tropilaelaps clareae* бар екенлигин көрсетеди. Дәслепки басқышта кеселликке диагнозды жабық нәсилди ашыў хәм онда жетилиспеген хәм үлкен кенелерди табыў арқалы қойыў мүмкин.



Сүўрет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pch
yol сайтынан жүклеп алынды.

Уяның түбине жабысқақ қағазлар қойып уядағы кенеден қаншелли дәрежеде зыян көргенлигин тексерий ушын қолланыў мүмкин. Лабораториядағы дәлийллер микроскоп астында морфологиялық тексерий диагностикасына тийкарланған. Дәстүрий полимераза шынжыры реакциясы хәм избе-излиги жәрдемінде тастыйықлайтуғын тестти өткерий мүмкин.

Алдын алыў хәм қарсы гүресий-пал ҳәрре семьясын кенениң сотадан хәм пал ҳәррелерден узақта болыўына жәрдем беретугын хәр қыйлы химиялық элементлер менен емлеў мүмкин. Қумырысқа кислотасының 85% ын 65% етемиз себеби кислоталы щелочьлардан пайдаланғанда Өзбекстан ықлымын есапқа алыў шәрт және бул щелочь пенен дәрилеўде сақлық илажларының көрилиўи хәм температура 27°C дан жоқары болмаўы шәрт.

Бисанар менен дәрилеў усылы-керосин щелочы жәрдемінде арнаўлы түтеткиш пенен түтетип дәриленеди. Барлық әмелиятлар ветеринар врач қадағалаўы хәм көрсетпелери тийкарында болыўы керек.

Кенени жыйнаў усыллары эфир ямаса қант унтағынан (Ritter & Schneider-Ritter, 1988) пайдаланыўды өз ишине алады. Шама менен 100-200 пал ҳәрреси кең мойынлы хәм винтли қақпағы бар шийше ыдысқа жыйналады. Пал ҳәррелерди қырып жулып тез ямаса өзгертилген вакуум

жәрдемінде оларды сорып алыу арқалы жыйнап алынады. Пал хәррелерди банканың төменине түсиру үшін күшли силкитиледи; төмендеги пал хәррелер қатламы 1-2 дюйм (2,54-5,08 см) болуы керек. Қақпақ алып тасланады хәм баслау үшін 2 секунд дауамында эфир жәрдемши суйықлығы себиледи. Альтернатив ретінде усының менен бир қатарда, барлық пал хәррелерди орау үшін жеткилики муғдардағы 70% спирт ямаса сабынлы суудан пайдаланыу мүмкин; шама менен 25 гр қумшекер унтағы (ямаса ун) қосылады. Егер эфир қолланылса, қақпақты алып таслау хәм ыдысты 10 секунд дауамында силкип ямаса қозғау керек; Кене банканың дийуалларына жабысып қалуы керек. Егер спирт ямаса сабынлы су қолланылса, ыдысты силкип, кейин пал хәррелерди майда



Сүйреп:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
 I сайтынан жүклеп алынды.

торлы фильтр жәрдемінде филтрлеу керек; суйықлық ағып кетип кене қалады. Қумшекерден пайдаланғанда банканың мойнына экран (мысалы, полат сетка) қойу хәм ақ қағазға аудару керек сонда кене көринеди. Анығырақ есаплау үшін барлық кенелерди жыйнау спиртли суйықлық ямаса сабынлы су жәрдемінде жуымақланады.

4.5. Нозематоз апис хәм нозематоз серано

Инвазив кеселлик болып пал хәррелер ишеклерінде дәрет суйылыуы ақыбетінде пал хәррелер тынышсызланып, олардың ортаңғы ишеклерінде өзгерис жүз береді. Арқа хәм Орта Жер теңизи регионьнда бул кеселлик пал хәррелерге үлкен зыян жеткереди хәм нәтийжеде көпшилик пал хәррелер күшсизленип, набыт болуы бақланады.



Клептокок апис.



Клептокок апис, бөлектеп алынған.

Сүйреп:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol
 сайтынан жүклеп алынды.

Кеселликти нозема апис тарқатып, орта ишектің эпителиал тоқымаларында паразитлик етеді. Айырым жағдайларда бүйрек ұазыйпасын орынлаушы түтікшелерин, (мальпигиевью түтікшелери) туқымлықларды, жақ безлерин хәм гемолимфани (қанды да) жаралайды. Пал хәрре денесинен сыртта нозема спора формасында сақланады. Ноземаның домалақ споралары узынлығы 5-6 мкм, ени 2,2-

3 ке тең болып, ол өз реңін тез өзгертеді (түсленеді). Спораның сыртқы бөлегі тығыз хитинге ұқсас қабық пенен оралған болып, ол өзине рең алмайды.



Сүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol_saytynan_juklep_alynady

Ноземаның споралары азықлық дерегі менен орта ишекке түсіп өсе баслайды. Орта ишектің эпителиал тоқымаларында ноземалар раўажланып ишек паразитлерине толады хәм ишек өз искерлигин тоқтатады.

Споралы нозематоз пал хәррелердің ишек бөлегінде уяның ишки температурасы 22°C тан 34°C қа шекем болғанда раўажланады. Егер уяның ишки температурасы 22°C тан төмен хәм 34°C жоқары болса, бундай

жағдайда паразиттің раўажланыуы тоқтайды.

Нозема споралары уяда хәм соталарда бир жылға шекем сақланады; пал 60°C қа шекем қыздырылғанда 1 сааттан кейін өледі. Суўлы 4% формалин еритпесінде 25°C температурада 1 саатта, формалин пуўында (муғдары 50 г 1 м3 көлемде) 35°C та 15 минутта, 2% суўлы фенол еритпесінде 10 минутта өледі.

Пал хәррелердің қыслау ўақтында қара пал (падь палы) менен азықланыуы нәтижесінде нозематоз кеселигі раўажланады.


Диагноз-қыстың ақыры хәм бәхәрдің басланыуында кеселленген семьяларда көпшилик пал хәррелердің айырым жағдайларда аналық хәррелердің набыт болыуы бақланады. Кеселленген пал хәррелердің қарын бөлегі үлкейіп кетеді. Орта ишегі ақ реңдегі көринисте болады. Орта ишекті шийше айна үстінде езіп, микроскоп астында тексергенде, жүдә көп санлы нозема спораларын көріу мүмкін.

Сүрөт: https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol_saytynan_juklep_alynady

Алдын алыу хәм қарсы гүресіу-кеселликтің алдын алыу мақсетінде қыс мәўсими ушын қалдырылған азық дереклеринің құрамында қара пал бар-жоқ екенлігі тексеріледі. Бәхәрде пал хәрре семьяларының құрғақ уясы ишки көлемін қысқартып жастықшалар менен ысытылып азықландырылады.

Қыслау мәўсिमінде кеселлик баланса, уя ишіндегі азықлық запас саў семьядан палы бар рамкалар алып келиніп алмастырылады. Ерте бәхәрде пал хәрре семьялары дезинфекцияланғаннан соң уяға көшіріледі. Пал хәррелердің дәретлери менен патасланған соталы рамкалар семья ишинен алынады хәм орнына таза, сапалы соталы рамкалар қойылады. Личинкалары бар соталы рамкалар жақсылап тазаланады, пал хәррелердің иши кетиуі нәтижесінде патасланған жерлер ыссы өткір пышақ жәрдемінде кесіп алынады. Рамкалардың тахташалары 4% лы формалин еритпеси менен тряпка (дасмал) жәрдемінде сыпырып тазаланады хәм тағы семьяның ортасына қойылады. Бәхәрде семьяның ишки көлеми пал хәррелер қаппап отырғанша

қысқартылып, уяның ортасына топланып, еки шетинен тосық пенен тосылып, ысытыушы жастықшалар жәрдемінде жақсылап ысытылады. Хәлсиз пал хәрре семьялары бир уяға 2-3 ден жайластырылады.



Сүүрөт:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pc_hyol_saytynan_juklep

Пал хәррелер 1 литр қант сиропына 50-100 мг фумагилиннен қосып емленеди. Мине сол муғдардағы дәриниң қант сиропын 30°C қа шекем суўытып, кейин қосылады. Емлеу суўықлығынан кеселленген семьяға бәхәрде 2-4 мәрте арадан 1-2 хәпте өткерип хәр бир семьяға 200 мл ден бериледи.

Пал хәррелерге дәриниң пал хәм кумшекер унтағына араластырылған қамыр сыяқлы азықлығына ямаса қант сиропына хәр бир 8-10 рамкада пал хәрресиниң күши бар семьяға 0,25 гр

муғдарда қосылады.

Ерте бәхәрде пал хәррелер биринши мәрте тез ушыўынан алдын жайып қойылған қамыр сыяқлы азықтың 10 кг на 5 гр ноземацид дәрисин қосып, хәр бир семьяға 0,5 кг нан бериледи.

Бәхәрги тез ушыўлардан кейин 5 гр ноземацидти 50 мл жыллы суўда жақсылап араластырып, кейин 20 л қант сиропына (1:1 муғдарда) араластырылады. Емлеу суўықлығын 2 мәрте 3-5 күннен хәрелер уасы ишиндеги азықлық салынатугын ыдысларға 100 мл ден хәр бир рамкадағы пал хәррелер есабынан бериледи.

Ал гүзде кеселликтің алдын алыу мақсетінде сол алдын жазылған нормада қант сиропына қосып бериледи хәм бир ўақытта саў жупласқан аналық хәрреге алмастырылады. Пал хәрре уялары хәм рамкалары дезинфекцияланады.

Рамкалар, уяның хәмме ағаштан жасалған бөлеклери, иш кетиўи нәтийжесінде патасланған жерлери жақсылап жуўылады хәм ыссы 2% лы кир жуўыу унтағы менен дезинфекцияланады. Хәррелердиң уялары хәм рамкалары алдынан жуўып тазаланғаннан кейин 4% формалин, 2% хиназол еритпеси жәрдемінде дезинфекцияланады. Өртли лампа жәрдемінде де дезинфекциялау мүмкин. Халат, жабыўша, сабақ торлы бас кийим хәм майда темир әсбаплары суўда 10 минут даўамында қайнатылып дезинфекцияланады. Бос соталы рамкалар да дезинфекцияланады.

Палы бар соталы рамкалардан пал алынып, кейин соталар жыллы суўда жуўылып, олар бөлмеден сыртта 25-30°C 4% лы суўлы формалин еритпесінде дәриленип, бос уяларға жайластырылады хәм уялар тығыз етип жаўылғаннан кейин, 3 саатқа бөлмеге апарылады. Бөлме температурасының 20-25°C ыссы болыуы тәмийинленеди. Дезинфекциялау ўақтында қол ушы вазелин менен майланады ямаса резина қолғап кийиледи. Арадан 3 саат өткеннен кейин, уядан ямаса қутыдан соталар алынып, 30°C жыллы суў менен жуўылып, жақсылап

қағып тасланады хәм самал келетуғын жерге асып қойылады. Суў менен қайтадан жуўылып, кейин 1% нашатыр спирти менен ызғарланып, формалин ийиси жоқ етиледі хәм жақсылап қағып қурғатып, самаллатылады.

Араластырылмаған сирке кислотасынан 200 мл (1 стакан) алынып, 12 рамка сыятуғын уя ишиндени бос соталы рамкалар менен толтырылып, рамкалар арасына ямаса қабатлары араларына азықлық ыдыслары, тосықлар қойылып, кислота менен ызғарланған дасмаллар жайластырылады. Уяда бос соталы рамкалар 16-18°C температурада 3 күн даўамында услап турылады. Кейин жақсылап самаллатылады.

5. Пал хәрре душпанлары хәм пал хәрре менен азықланыўшы жыртқышлар

5.1. Қуслар



Сүўпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol сайтынан жүклеп

Пал хәррелердин жыртқыш душпанлары пал хәрре уясынан сыртта жасайды, олар пал хәррелерге хұжим жасайды ямаса пал урлайды. Нәтийжеде пал хәрре семьялары хәлсирейди хәм өнімдарлықтың азайыўына алып келеди.

Пал хәрре душпанларының ишиндеги қәўиплиери төмендегилер саналады: гүмис реңли куркунак қусы, пал хәрре жыртқышы, қара маңлайлы сорокопұт, сарғылтым сорокопұт.



Сүўпет:
https://pikabu.ru/story/bolezni_pchyol

Зыянлары-пал хәрре менен азықланатуғын қуслар пал хәррешилик майданына топарласып ушып келип, нектар тасыўшы хәм нектар излеўшы пал хәррелерди тутып алып жеўи ақыбетинде нектар жыйнаў процесине үлкен зыян жеткереді.

Пал хәррешилик майданында пал хәрре менен азықланыўшы қустың жейтуғын азығының 80-90%-ын пал хәррелер қурайды. Егер пал хәрре семьяларының 30% сыртқа ушатуғын пал хәрре есапланса, онда бир қус бир күнде 2-3% шекем пал хәррени жейди. Бир жуп қус 2-3 ай даўамында 20 мыңға жақын, ал 100 қустан ибарат топар пал хәррешилик хожалығының 50% пал хәррелерге зыян жеткереді.

Анықлаў жолы - пал хәррешилик майданы әтирапындағы қусларды бақлаў арқалы анықлаў

мүмкин.

Алдын алыу хәм қарсы гүресиу-құстардың көбейиуиниң алдын алыу ушын олардың уяларын азайтыу керек. Пал хәррешилик майданларына тор тартып шығыу, үркитиуши, дауыс шығаратуғын құрылмалар орнатыу хәм пал хәррешилик майданларын тез-тез алмастырып турыу арқали құстардан қорғауға болады.

5.2. Насекомалар

Үлкен мум күйе гүбелеги-личинкалары мум менен азықланатуғын, түнги ўақыт ушатуғын мум күйе гүбелеги. Мум күйе личинкасы мум менен



Сүүрем:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami>
сайтынан жүклеп алынды.

азықланып, соталарды толық жарамсыз халға келтиреді хәм соның нәтийжесинде пал хәррелер семьяны таслап кетеді. Үлкен мум күйе гүбелегиниң алдыңғы қанаты күлрең қаралтым точкалы хәм артқы қанаты алдыңғысынан бираз ақшыл түске ийе. Үлкен мум күйе гүбелегиниң ұзынлығы 15-20 мм. Қанатын жайғанда 30-35 мм тең. Аңсат бүгилгиш қәсийетине ийе мурты 60 буўыннан ибарат.

Еркеги урғашысына қарағанда кишилеу, денесиниң ұзынлығы 16 мм.

Майда мум күйе гүбелегиниң ұзынлығы 12 мм шекем болады. Тыныш отырған ўақытта қанатларын жазып отырады. Еркек гүбелеклер қуўыршақтан шыққанына бир неше саат өткеннен соң урғашы гүбелеклер менен жупласады. Жупласқаннан кейин арадан 2-3 күн өтип, урғашы гүбелек уядағы тахталардың сызықлары арасына, уяның төмениндеги патас шығындыларға, қақпақ астындағы тесиклерге, ал хәлсиз семьяларда соталарға 80-100 шекем мәйек қояды. Соң басқа жерге ямаса уяларға өтип, тап сол тәризде мәйек қойыуын даўам етеді.



Сүүрем:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami>
сайтынан жүклеп алынды.

Урғашы гүбелек 26 кунге шекем өмир сүреді, сол ўақыт ишинде 1500-2000 данаға шекем мәйек қояды. Температура 30°-36°С ыссы болғанда олардың мәйеги 8-10 күн ишинде, температура төмен болса 12 күн ишинде раўажланады. Мәйектен личинка шығады хәм оның реңи гүңгирт ақ реңдеги, бас бөлеги қоңыр болады. Денеси 13 сақыйнадан ибарат. Соннан 3 көкирегінде, ал 10 қарын сақыйналары есапланады.



Сүӱрем: <https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami> сайтынан жүклөп алынды.

Мум күйе гүбелеги бир жылда 2-4 нәсил береді. Теориялық тийкарларға қарағанда бір жуп мум күйеси бір жыл дауамында 1 миллиардқа шекем нәсил бериуі мүмкін екен (бір жылда 3 нәсил шықса хәм хәр бир урғашы гүбелек 1000 мәйек қойса). Егер хәр бир личинка өзиниң толық рауажланыуына 0,4 гр шекем мум қабылласса хәм 500 данаға шекем инди истен шығарса: онда 1 миллиард личинканың азығы ушын 250 тонна мум керек болады. Мум күйесиниң рауажланыуы ҳауа температурасына байланысly. Температура +10°C болғанда олардың рауажланыуы тоқтайды. Температура төменлеп кетсе, олар толық өледі.



Сүӱрем:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami> сайтынан жүклөп алынды.

Мум күйесине қарсы гүресий илажлары. Соталарға мум күйеси гүбелеги хәм олардың личинкалары түсип рауажланбауы ушын соталар хәм уялар дезинфекцияланады. Ол ушын арнаулы қуты ямаса пал хәрре уялары тығыз жабылып, хәр 1 м³ көлемге 50 гр формалин ямаса 150 гр күкирт пенен қайта исленеди. Мум күйесине қарсы гүресийде соталарға энтобактерин (микроблы дәри) жақсы нәтийже береді. Пал хәррелер ушын бул дәри зыянсыз саналады.

Пал хәррешилик хожалықларында пал хәрре семьяларын көзден өткерип, қууыршаққа айланған хәм айланбаған личинкалар қол менен езип тасланады хәм уяның асты хәм мүйешлери тазаланып, семьяның ишки көлеми қысқартылады.

Киши мум күйе гүбелеги-киши мум күйеси де үлкен мум күйеси сыяқлы көп тарқалған болып, ол үлкен мум күйеден бираз кишилеу болады. Урғашысы қанатын жайғанда 23 мм, ал еркеги қанатын жайғанда 18 мм ге тең.



Сүӱрем:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami> сайтынан жүклөп алынды.

Қанатының реңи бирдей түрде болып, күл рең көринисте, майланғанға

уқсап турады. Мәйеги тап үлкен мум күйеникине уқсас.

Личинкалары ақшыл-сары, ал басы сарғылт реңде. Личинкасы раўажланыў уақтында 15 дәўирди бастан кеширеди. Орташалары үлкен мум күйесиниң личинкасына салыстырғанда көбирек шығынды қалдықларын қалдырады. Кишкене мум күйениң личинкасы шаққан болып, тез ҳәрекет етеди. Қол тийгизгенде, ол турған жеринде тырп етпей қатып қалады. Олар өзлерине жолды сотаның ортасынан емес, ал қәлеген бир мушынан салады, тийкарынан пал ҳәрре қуўыршақларын зыянлайды.

Жарақатланған жас қуўыршақлар ининиң түбинен бираз жоқарыға жылжып кетиўи себепли пал ҳәррелер инниң үстин толық жаўмай, тек шетлерин шама менен ярым градусқа, яғный инниң орталарын ашық қалдырып жабады. Толық жабылмаған инлердиң шетлерин бираз сыртқа қаратып жабады. Бунда личинкалы инлер, тийкарынан, бир қатарда жайласады.

Пал ҳәррелердиң бундай инлерде жатырған қуўыршақлары метаморфоз жағдайын пүткиллей жоғалтып, көзлери тынық ҳаўа рең жағдайына киргенде олар өле баслайды. Бундай қуўыршақларды тексергенде, олардың қанатлары ҳәм аяқлары жараланған болып, қарын бөлеги мум күйеси личинкасының шығындысы менен оралған болады. Инлерден өлген пал ҳәрре қуўыршақлары алынғанда пал ҳәррелер ининиң түбинде мум күйеси личинкаларының раўажланыў уақтындағы жолларын көрийў мүмкин.

Турмыс тәризи үлкен мум күйе гүбелеги менен бирдей.

Кеселликтиң алдын алыў ҳәм гүресийў үлкен мум күйесине қарсы исленетуғын илажлар менен бирдей.



Сүүрем:

<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami>
сайтынан жүклеп алынды.

Филант ямаса жабайы ҳәрре-
филант ямаса жабайы ҳәрре де пал ҳәррелерге қыран келтирийўши күшли ҳәм тез ҳәрекет ететуғын, жалғыз жасайтуғын жер ҳәрреси болып, үлкен жастағылары өсимликлер нектары ямаса нектар жыйнаўшы пал ҳәррелердиң пал қалташасы менен азықланады, личинка ҳалында урғашы филант тәрәпинен шағып ҳәрекетсизлендирилген үлкен жастағы пал ҳәррелердиң денесин жеп раўажланады.


Филантлар орта жер ҳәм қубла регионлардағы аймақларда тарқалған болып, пал ҳәррешилик раўажланған үлке ҳәм регионларда көбейип, пал ҳәррешилик хожалығына үлкен зыян жеткереді.

Үлкен жастағы филант тынық-сары ҳәм қара жолақ реңде болады. Бас бөлеги үлкен болып, күшли жақ бөлегине ийе.

Еркек ҳәм урғашы ҳәрре сыртқы көриниси ҳәм көлеми бойынша ҳәр түрли болып, еркегиниң узынлығы 12 мм ге жақын, урғашысынан кишилеў, басы үлкен, көкиреги басынан бираз енсиз; қарын бөлеги узынлаў болып,



Сүйреп:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami>
 сайтынан жүктеп алынды.



Сүйреп:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami>
 сайтынан жүктеп алынды.

көкірегі менен тутасатуғын жиңишке бөлектен ибарат. Көкірек хәм қарын бөлегінің төменгі тәрәпи қаралау реңге ийе. Қарын бөлегі хәр бир сақыйналардың (сегмент) ортасы қаралау, ал шетлери сарғылт көринисте. Еркегинде қорғаныушы найзасы болмайды. Еркегі 10-12 күнде рауажланып, урғашы хәррениң уясының жанына ин қурады.

Урғашысының узынлығы 15 мм, бас бөлегі жүдә кең, күшли жақ бөлегине ийе, көкірек бөлегі бираз кең хәм ири. Қарын бөлегі көбирек сары реңли болып, бираз

билинер-билинбес қаралтым болады. Урғашы хәррелердің алдыңғы жуп аяқларының артқы бууынларында ин қазыуға мөлшерленген пәтпелек тәризли қурылмасы бар. Урғашысының қарын бөлегі жиңишке найза бөлегі менен тамамланады.

Температура 20-25°C хәм оннан жоқары болса филантлар ушын рауажланыуға қолайлы шәраят саналады. Температура 15°C тан төмен болса ямаса

жауын-шашынлы хауа олардың рауажланыуына унамсыз тәсир көрсетеди хәм бундай хауа райында филантлар гүллерге ушыуды тоқтатып, инлеринде отырады. Олардың жасауы ушын әлбетте пал хәррелер болыуы керек, егер пал хәррелер болмаса, олар набыт болады.

Филантлардың урғашысы пал хәррелердің қырыушысы саналады. Олар пал хәррелерди гүллерден нектар хәм гүл шаңын жыйнау уақтында хәм даладан уяларына қайтып киятырғанда тутып алады. Урғашы филантлар пал хәррелердің жақынласып киятырғанын сезип, оларға тасланады хәм күшлилеу болғаны ушын пал хәррени жақлары менен тутып алып, алдыңғы хәм орта көкірек бөлегі арасына ямаса алдыңғы көкірек бөлегі менен бас бөлегі аралығына ийнесин суғады хәм зәхәр менен шағылған пал хәрре көкірек булшық етлери хәрекетсизленип, өз хәрекетин пүткиллей жоғалтады. Хәрекетсиз қалған пал хәррелерди филант өз аяқлары менен қарын бөлегине басып, пал қалташасындағы палды қустырып, сорып алады. Егер жер астындағы инлери тайын болса, онда өлген пал хәррелерди жер асты инлерине личинкачаларын азықландырыу ушын топлап қояды.

Урғашы филант 25-40 күн жасайды. Филант жасау дәуиринде 4-8 жер асты инлерин қурады хәм хәр бир инге 3-6, айырым жағдайларда 8 ге шекем хәлсиреген пал хәррелерди тасыйды. Урғашы филант хәр бир қурған инине қоятуғын мәйегин инине тасып әкелген пал хәррелердің

көкирегине жабыстырып қояды. Мәйеги ақ, ұзынлығы 4-6 мм, бир аз иймейген болып, цилиндр формасында болады. Мәйектен 3-4 күн өткеннен ақ реңли, аяқсыз, бөлімлерге бөлінген формадағы личинка шығады. Личинкачаның алдыңғы бөлеги жиңишке болып, кишкене басы болады. Личинкачаның арқа бөлеги бираз қалың болады. Личинкасы ин ишине топланған пал хәрре денелери менен азықланады хәм тез өседі. Арадан 4-5 күн өткеннен соң, ол үлкен жастағы личинка жағдайына жетип, ұзынлығы 12-15 мм ге тең болады. Қуұыршақ жағдайы пилле орағаннан кейин басланады. Үлкен жастағы личинка бир неше күн дауамында үлкен жылтыр қоңыр-қара шийшеге уқсас пилле орайды. Ораған пиллесине суу да өтпейді. Қуұыршақ жағдайында филант 10 айға жақын жатады, аязлы қыс күнлерінде арқайын қыслап шығыу қәбилетине ийе, пилледен еркек хәм урғашы филантлар шығады. Филантлардың инлери каналлар, жапсалма шетлери, жыралардың төбелерине кеңлиги 0,9 -1,0 см, жер ишине иймек 30-80 см хәм оннан узын етип қурады. Олар ининен күннің ыссы пайытларында саат 10 нан 19 ларға шекем шығады.

Филантлардың пал хәррешиликке келтиретуғын зыяны күтә үлкен болып, пал хәррелерди услап алыуы пал хәррешилик майданларында хәм этирапында жүз береді. Олардың шабылыулары дым көп дәрежеде болады хәм пал хәррелер нектар тасыуға шықпай қалады.



Сүӱрет:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami> сайтынан

Қарсы гүресіу ілажлары. Олар жасайтуғын инлерин табыу хәм жоқ қылыу жұмыслары күндіз жаз айының орталарында алып барылады. Шөп өспейтуғын қурғақ жерлерде қандай да бир ыдысты төңкеріп қойғандай топырақ үйіншиклерин ушыратыу хәм ол жерди қазып көргенде пал хәрре денелерин көріу мүмкін.

Филантларға қарсы гүресіуде жерди айдап, сууды тасытыу хәм инлерине суу қуйып езип таслау хәм нигрол, соляркаға химиялық уулы затларды қосып қуйыу жақсы нәтиже береді.

Ең жақсысы филантлар ин салған хәм көбейетуғын аймақтан олар балаларын жетистириу уақтында пал хәрре семьяларын көширип алып кетиу мақсетке мууапық болады.

Филантлардан басқа жыртқыш насекомалардан майда сары хәрре, ири ешек хәрре, қара ири хәрре, ийнеликлер, қумырысқалар да пал хәррелерге үлкен қырғын келтиреді хәм пал хәррешилик өнімдарлығының төменлеп кетиуіне себепши болады.

Сары хәрреге қарсы гүресіу ушын олардың инлерин бузып таслау, ерте бәхәрде урғашыларын өлтирип таслау (қыслап шыққан жеке баслы урғашылары ири болып, қарны жүдә созылған болады), пал хәррешилик



Сүүрөт:
<https://beejournal.ru/borba-s-boleznyami-i-vreditelyami> сайтынан
жүклөп алынды.

майданында реңли ыдысларға сироп қуйып илип қойыў усыныс етиледі.

Үлкен қоңыр хәм қара ешек хәррелерди ерте бәхәрде пал хәррениң уясына дара-дара болып ушып келип, пал хәррелерди ушлап кетип атырғанында урып өлтириў, ең жақсысы пал хәррениң уясында аўызы кеңлеў шийше ыдысларға арнаўлы ийис беретугын, яғный феромонлар қуйып қойыў ямаса ыды

Әдебиатлар дизими

1. Аветисян Г.А., Черевко Ю.А. “Пчеловодство”. Москва 2001 йил.
2. Крахотин Н.Ф. Ўзбекистонда асаларичилик. Тошкент. Меҳнат, 1991 йил.
3. А.И.Исамухамедов – «Асаларичилик» Т. Ўқитувчи. 1995.
4. Н. Ф.Крахотин «Календарь пчеловода».М.1989.
5. А.Г. Авестесян “Пчеловодства” М.
6. А.С. Нуждин «Основы пчеловодства» М. 1988.
7. И.Х. Иргашев., С.С.Старков. «Основы пчеловодства и болезни пчел». Т., Меҳнат, 1987.
8. Т.Ш.Акмалхонов «Асаларичилик» (маъруза матнлари) Т.2000.
9. <https://kurya.ru/>.
10. <https://beekeepers.uz/>.
11. <https://pikabu.ru/>.
12. <https://hozyain.by/paseka/virusnye-bolezni-pchel/>.