

ଲିଟର ଔଷଧକୁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବୁଣିବାର ଦିନେ ବା ଦୁଇଦିନ ପରେ ଜମିରେ ବତର ଥାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦମନ ହୋଇଥାଏ ।

(୯) ଜଳସେଚନ :

ମାଟିର ବତର ଦେଖି ୧୫-୨୦ ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଧରିବା, ମଞ୍ଜି ଧରିବା ଓ ପୁରଣ ହେବା ବେଳେ ନିହାତି ଦୁଇଟି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଜଳସେଚନ କଲେ ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ମରିଯାଏ ।

(୧୦) ଅମଳ :

ବୁଟ ଫସଲ ପ୍ରାୟ ୧୦୦-୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ପାଚିଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ କାଟି ଖରାରେ ୫-୬ ଦିନ ଶୁଖାଇ ହଳ ବୁଲାଇ ବୁଟ ଆଦାୟ କରାଯାଏ । ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨-୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୁଟ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ । କାବୁଲି ବୁଟରୁ ୧୦-୧୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ ।

(୧୧) ସାଇତା ପ୍ରଣାଳୀ :

ବୁଟ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୧୨ ଭାଗ ରହିଲେ ପଲିଥିନ ଅଖାରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ।

(୧୨) ନେଟ୍ ଆୟ :

ବୁଟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟ.୪,୫୦୦ଙ୍କା ଦରରେ ବିକିଲେ ଏକ ହେକ୍ଟର (୧୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ) ରୁ ଟ.୫୪,୦୦୦ଙ୍କା ମିଳିବ । ଚାଷବାସ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଟ.୨୮୦୦୦ଙ୍କା ଯାଇ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୯୦-୧୦୦ ଦିନରେ ଟ.୨୪୦୦୦-୨୬୦୦୦ଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।

ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା :

୧. ଉନ୍ନତ, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ରତୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିରୋଳା ଓ ରୋଗ ପୋକ ସହଣୀ ବିହନର ବ୍ୟବହାର ।
୨. ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର ।
୩. ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ଉପଚାର ।
୪. ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ତୁନ ବ୍ୟବହାର ।
୫. ଧାଡ଼ି ବୁଣା ଓ ୨-୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ ବଛା ।
୬. ଅନୁମୋଦିତ ଫସ୍ତେଟ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର ।
୭. ଦରକାର ବେଳେ ଜଳସେଚନ (ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ) ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ଡି.ଏ.ପି. ସାର ସିଞ୍ଚନ ।
୮. ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋକ ରୋଗ ଦମନ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଟ ଚାଷ



ଓଡ଼ିଶା ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନା
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସମ୍ବଳିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା,
ଏବଂ

ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)

South Asia & China Regional Program (SACRP)
NASC Complex, Pusa Campus, DPS Marg, New Delhi-110012
Phone : +91(11)25847505; Fax : +91(11)25847503

ବୁଟ

ଉପକ୍ରମ :

ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଟର ବିସ୍ତୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୦.୪୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଓ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ୦.୩୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଟେ । ଏହା ରବି ଫସଲ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

(୧) ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ :

ମଝାଳିଆ ଓ ଖାଲଜମି, ମଟାଳ କିମ୍ବା ଦୋରସା ମାଟିରେ ବୁଟ ଭଲ ହୁଏ । ମୃତ୍ତିକାରେ କାଦୁଅ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହେ ଓ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ । ବୁଟ ଫସଲର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି, ଫୁଲ ଓ ଫଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଶୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ଓ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

(୨) ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ହେକ୍ଟରକୁ ୧ ଟନ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାଟି ଅମ୍ଳିୟ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପି.ଏଚ୍. (pH) ୬ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଚୂନ କିମ୍ବା କାଗଜ କଳ ମଇଳାକୁ ସମ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା, ସଡ଼ା ଓ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ ସହ ମିଶାଇ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

(୩) ବିହନ ପରିମାଣ :

ଏକ ହେକ୍ଟରକୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଦରକାର ।

(୪) ବୁଣିବା ସମୟ :

ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବୁଣା କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିବ ।

(୫) ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ବୀଜାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ :

ପ୍ରତି ୧କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିହନକୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ୍ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାର୍ବାଣ୍ଡିଜିମ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବୀଜାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚେରରେ ଅଧିକ ଭାଉଡ଼ି ବା ଗଣ୍ଡି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ସେହିପରି ପି.ଏସ୍.ବି. (ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ) କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଫସ୍‌ଫେଟ୍‌ସ୍କୁ ସହଜ ଲଭ୍ୟ କରି ଗଛର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଦଶ

କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବୀଜାଣୁ କଲଚର ଏବଂ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପି.ଏସ୍.ବି. ବୀଜାଣୁ କଲଚର, ୪ ଗ୍ରାମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମଲିବଡେଟ୍‌କୁ ୮୦୦-୧୦୦୦ ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ମଣ୍ଡ କରି ମଣ୍ଡକୁ ମଞ୍ଜି ସହିତ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ବୁଣାକାମ ସାରନ୍ତୁ । ବୀଜାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବୀଜାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

(୬) ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ :

ଜମିରୁ ବତର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା କାମ ସାରନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।

(୭) ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ :

ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳସାର ଭାବରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଟ୍ରିଆ) , ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ (୨୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍‌ଫେଟ୍) ଓ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ (୩୩ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍) ସାରକୁ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଅଭାବରେ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଡି.ଏ.ପି.ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଓଡ଼ିଶା ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉନ୍ନତ ବୁଟ କିସମ

କିସମ	ଅବଧି(ଦିନ)	ଉଦ୍‌ଭବ ରାଜ୍ୟ	ଅମଳ (କୁଇଣ୍ଟାଲ)	ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ
ସି.ଏସ୍.ଜେ.କେ-୬	୧୩୦-୧୩୫	ରାଜସ୍ଥାନ	୧୫-୨୦	ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିରୋଧକ ।
ଆର୍.ଏସ୍.ଜି.କେ-୬	୧୩୦-୧୩୫	ରାଜସ୍ଥାନ	୧୫-୨୦	ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିରୋଧକ ।

(୮) ଅନ୍ତତାପ :

ଫସଲକୁ ତିନିସପ୍ତାହ ହେଲେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ସ୍ଟ୍ରିଆ କିମ୍ବା ଡି.ଏ.ପି. ୧.୫-୨ ପ୍ରତିଶତ (୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡି.ଏ.ପି. ୧୫ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ପେଣ୍ଡିମିଥାଲିନ୍ (ପ୍ରାକ୍-ଉତ୍ଥାନ ତୃଣକ ବିଷ) ହେକ୍ଟର ପିଛା ୦.୭୫ କି.ଗ୍ରା. ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ୨.୫