



(୮) ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର :

ବିରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ୨୦ ରୁ ୨୧ ଦିନ ହୋଇଗଲେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ଘାସ ବଛା କାମ ସାରି ଦେବା ବିଧେୟ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗଛ ୩୦-୩୫ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଘାସବାଛି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘାସ ନ ବାଛିଲେ ଶତକଡ଼ା ୪୦ ଭାଗ ଅମଳ କମିଥାଏ । ଘାସବଛା ପାଇଁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥିଲେ ଘାସମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର

କରାଯାଇପାରିବ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପେଣ୍ଟମେଥାଲିନ୍ ବା ସ୍ପ୍ରେ ୨.୫ ଲିଟରକୁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ କିମ୍ବା ଗଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ବତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଘାସ ବହୁତ କମ୍ ଉଠିଥାଏ । ଗଛ ୧୮-୨୦ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର କୁଇଜାଲଫଫୋରସ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

(୯) ଜଳସେଚନ :

ବର୍ଷାରତ୍ନ : ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବିରି ଫସଲ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନେ ବିରି କିଆରିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ରବି ରତ୍ନ : ମାଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ବତର ଥାଇ ବିହନ ବୁଣିଲେ ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ବତର କମିଗଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେବେ ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବତର ଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ କଲେ ଅମଳ କମି ଥାଏ । ଏଣୁ ଡାଲି ଫସଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କେବଳ ଫୁଲ ଓ ଛୁଇଁ ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଜଳସେଚନ କଲେ ଶତକଡ଼ା ୨୦-୪୦ ଭାଗ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବତର ଥାଇ ବା ଜଳସେଚନ ପରେ ବତର ଆଣି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ । ଏହାପରେ ଫୁଲ ବା ଛୁଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ (୫ ସେ.ମି.) ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଡାଲି ଫସଲର ଅମଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ : ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ବିରି ଚାଷ କଲେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ବିରି ଫସଲ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ୪ଟି ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଦରକାର । ପ୍ରତିଥର ୫ ସେ.ମି. ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ ।

ପ୍ରଥମ ଜଳସେଚନ : ବିହନ ବୁଣିବା ପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କିମ୍ବା ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ବତର ଆଣିବା ପାଇଁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ : ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ କୋଡ଼ାକୋସା ସାରି ଦେଇ ଛୁଡ଼ା ଟେକି ପାଣି ମଡ଼ାଇବେ ।

ତୃତୀୟ : ଫୁଲ ଧରିବା ବେଳେ ।

ଚତୁର୍ଥ : ଫଳ ଧରିବା ବା ଛୁଇଁ ବଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଶେଷ ଥର ପାଣି ଦିଆଯାଏ ।

(୧୦) ଅମଳ :

ବିରିଛୁଇଁ ଅଧିକ ଶୁଖିଗଲେ ଗଛରେ ଫାଟିଯାଏ । ଛୁଇଁ ଫାଟିଯିବା ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜି ବାହାରି ଜମିରେ ଛିଟିକି ପଡ଼େ । ଏଣୁ ଛୁଇଁ ୭୫-୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ପାକଳ ଛୁଇଁ ତୋଳି ନେଇ ଗଛକୁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଗଛକୁ ମୂଳରୁ କାଟିଆଣି ଚେର ମାଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିରି ଚାଷ କଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆଦାୟ ୮-୧୦ କୃଷ୍ଣାଲ ହୋଇଥାଏ ।

(୧୧) ସାଇତା ପ୍ରଣାଳୀ :

ଅମଳ ପରେ ବିହନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସାଇତି ରଖିବା ବେଳକୁ ବିହନରେ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗରୁ କମ୍ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସମୟରେ ବିହନ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳାଇ ସାଇତି ରଖିଲେ ପୋକ ଲାଗିବା କମିଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣାଲ ପିଛା ୫ ମି.ଲି. ଇ.ଡି.ବି.ଆମ୍ବୁଲ (ଇଥିଲିନ୍ ଡାଇବ୍ରୋମାଇଡ୍) ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଲେ ସାଇତା ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ।



(୧୨) ନେଟ୍ ଆୟ :

ବିରି କୃଷ୍ଣାଲ ଟ ୫,୪୦୦ଙ୍କା ଦରରେ ବିକିଲେ ଏକ ହେକ୍ଟର (୧୦ କୃଷ୍ଣାଲ ହିସାବରେ) ରୁ ଟ ୫୪,୦୦୦ଙ୍କା ମିଳିବ ଚାଷବାସ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଟ ୩୫,୦୦୦ଙ୍କା ଯାଇ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୭୦-୭୫ ଦିନରେ ଟ ୧୯,୦୦୦ଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।

ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା :

୧. ଉନ୍ନତ, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ରତ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିରୋଳା, ରୋଗ ଓ ପୋକ ସହଣୀ ବିହନର ବ୍ୟବହାର ।

୨. ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ଉପଚାର

୩. ଧାଡ଼ିବୁଣା ଓ ୨-୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ ବଛା ।

୪. ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ତୁନ ବ୍ୟବହାର ।

୫. ଅନୁମୋଦିତ ଫସ୍ତଫେଟ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର ।

୬. ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଏହାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ଡି.ଏ.ପି. ସାର ସିଞ୍ଚନ ।

୭. ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋକ ରୋଗ ଦମନ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିରି ଚାଷ



ଓଡ଼ିଶା ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନା
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସମ୍ବଳିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା,
ଏବଂ

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)

South Asia & China Regional Program (SACRP)
NASC Complex, Pusa Campus, DPS Marg, New Delhi-110012
Phone : +91(11)25847505; Fax : +91(11)25847503

ବିରି

ଉପକ୍ରମ :

ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଦେଶର ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ୭୪୪ କି.ଗ୍ରା. ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ୫୦୮ କି.ଗ୍ରା. ଅଟେ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡ଼ାଲି ଶସ୍ୟ ହେଉଥିବା ୨୦.୮୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ୫.୬୮ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବିରି ଚାଷ କରାଯାଇ ବାର୍ଷିକ ୨.୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବିରି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

(୧) ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ :

ନିଗିଡ଼ା, ପଚୁ, ଦୋରସା ଓ ମଟାଳ ମାଟିରେ ବିରି ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୫.୬ ରୁ ୭.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଲୁଣି ଅଥବା କ୍ଷାରୀ ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ଅମଳ ଦିଏ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୧୮୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବିରି ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଭଲ । ଅଧିକ ଶୀତ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।



(୨) ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୨/୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର । ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୨ ଶଗଡ଼ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ବା ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଦରକାର । ଧାନ ପରେ ବିରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଧାନ ମୂଳି ୧୦-୧୨ ସେ.ମି ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଧାନ କାଟନ୍ତୁ ଓ ଧାନ ମୂଳିକୁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

(୩) ବିହନ ପରିମାଣ :

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ୨୫-୩୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମୁହାଁ ଫସଲ ରୂପେ ବିରି ବୁଣୁଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପତି ୩୭ ରୁ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(୪) ବୁଣିବା ସମୟ :

ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ :- ଜୁଲାଇ ମାସ ୧୫-୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣିଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣିଲେ ଛୁଇଁ ପାକଳ ହେବା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ବୁଣିଲେ ବର୍ଷା ପାଣିଖାଇ ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋକରୋଗ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶା ଡ଼ାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉନ୍ନତ ବିରି କିସମ				
କିସମ	ଅବଧି(ଦିନ)	ଉଦ୍ଭବ ରାଜ୍ୟ	ଅମଳ(କିଲୋଲ)	ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ
ଶେଖର-୨	୭୦-୭୫	ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ	୧୧-୧୨	ସାହେବୀ ରୋଗ ନିରୋଧକ । ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ପି.ୟୁ - ୩୧	୭୦-୮୦	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	୮-୧୦	ସାହେବୀ ରୋଗ ଓ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ସହଣୀ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ପି.ୟୁ - ୩୫	୭୫-୮୦	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	୧୦	ସାହେବୀ ଓ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ସହଣୀ ।
ସାରଦା	୮୫	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	୯-୧୦	ସାହେବୀ ରୋଗ ସହନଶୀଳ ।
ନିଆଳି ବିରି	୮୦	ଓଡ଼ିଶା	୯	ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ।

ପ୍ରାକ୍ ରବି :- ସେପ୍ଟେମ୍ବର (୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ) ମାସରେ ବୁଣିଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ରବି :- ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ଼ିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାଯାଇପାରିବ ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ :- ଫେବୃୟାରୀ ୨୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ବିରି ବୁଣିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଡ଼େରି କଲେ ରୋଗ ପୋକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଗି ଅମଳ ବହୁତ କମିଯାଏ ।

(୫) ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ବୀଜାଣୁ କଲଚରର ପ୍ରୟୋଗ :

ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ସହିତ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାଭିକ୍ସିନ୍ ଗୋଳାଇ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ । ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣିଲେ ବିହନ ଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନର ୬ ଦିନ ପରେ ବୀଜାଣୁ କଲଚରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଧେୟ । ବିହନକୁ ବୀଜାଣୁ କଲଚରରେ ଗୋଳାଇ ବୁଣିଲେ ଚେରରେ ଭାତୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ଭଲ ଗଜା ବାହାରେ ଏବଂ ଅମଳ ଶତକଡ଼ା ୧୫ ରୁ ୨୦ ଭାଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଲାଗୁଥିବା ୨୫-୩୦ କିଗ୍ରା ବିହନ ପାଇଁ ୬୨୫-୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ବୀଜାଣୁ କଲଚର ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମେ ୬୨୫-୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କଲଚରକୁ ସମ ପରିମାଣର ପି.ଏସ୍.ବି, ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼, ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମଲିବିଡେଟ୍ ଓ ୮୦୦ ମି.ଲି. ପାଣି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ମଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ । ସେହି ମଣ୍ଡରେ ୨୫-୩୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ଭଲ ଭାବରେ

ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କଲଚର୍ ମଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିହନ ଉପରେ ଲାଗିବ । ଏହି ବିହନକୁ ପରିଷ୍କାର ସିମେଣ୍ଟ ଟଟାଣ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ଉପରେ ଛାଇରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଉପରବେଳା ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।

(୬) ବିହନ ବୁଣା :

ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରି ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ଉଚିତ । ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିଲେ ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କୋଡ଼ାଖୋସା କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ୧୫ ଭାଗ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ତା’ଛଡ଼ା ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରହେ । ପ୍ରତି ଡିନି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା.ଚୂନ ବିହନ ବୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି., ପ୍ରାକ ରବି ଓ ରବି ଋତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନ ବୁଣାଯାଏ । ଗଛ ଗଜା ହେବାର ୭-୮ ଦିନ ପରେ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛକୁ ପତଳା କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଫଳରେ ଜମିରେ ଏକ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୪୦ଟି ଗଛ ରହିବ ଓ ଆଦାୟ ଭଲ ହେବ । ପାଇରା ଫସଲ ହିସାବରେ ବିରି ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବିହନକୁ ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଧାନ ଜମିରେ ଛାଟିଦେଲେ ଜମିରେ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ବାହାରିଥାଏ । ଧାନ କାଟିବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମାଟି କାଦୁଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଛାଟନ୍ତୁ ।

(୭) ସାର ପ୍ରୟୋଗ :

ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଫସଲକୁ ସାର ଦେବା ଉଚିତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ + ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫଫରସ୍ କିମ୍ବା ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା ଡ଼ି.ଏ. ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ) + ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର୍ ଫସଫେଟ୍ ସାର କିମ୍ବା ସବୁତକ ଡ଼ି.ଏ.ପି. ସାର ଏବଂ ୩୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହାଛଡ଼ା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଗନ୍ଧକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପ୍ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର୍ ଫସଫେଟ୍ କିମ୍ବା ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଜିପ୍ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ । ଡ଼ି.ଏ. ପି.ସାର ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଥରେ ଏବଂ ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉଥରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଆଦାୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।

