



أفضل الممارسات في إدارة أغنام العواس

1

مرحلة التزاوج

**Best Practices for Managing
Awassi Sheep
1- Mating**

The information in this booklet was
compiled by: Adnan Termanini, Ali
Nefzaoui and Barbara Rischkowsky
Revised by: Tim Treacher

Illustration, layout and design by:
Fahed Hariri
Photography by: Adnan Termanini

For more information please contact:
Dr Barbara Rischkowsky
b.rischkowsky@cgiar.org
ICARDA, P. O. Box: 4566, Aleppo,
Syria
Tel: +963 21 2691 0000
Fax: +963 21 2213490

Electronic copy can be found on:
www.icarda.org

**أفضل الممارسات في إدارة أغنام العواس
1- مرحلة التزاوج**

تم تجميع المعلومات في هذا الكتيب من
قبل: عدنان ترماني، علي نفزاوي، باربرا
ريشكوفسكي.
مراجعة: تيم تريشر

تصميم ورسوم وإخراج: فهد حريري
تصوير: عدنان ترماني

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال مع:
د. باربرا ريشكوفسكي
b.rischkowsky@cgiar.org
ايقاردا - ص. ب. 5466، حلب - سورية
هاتف: +963 21 2691 0000
فاكس: +963 21 2213490

يمكن الحصول على نسخة الكترونية من هذا
الكتيب من: www.icarda.org

الفهرس

1	 الدورة الإنتاجية وتغيرات الوزن
2	 تحضير النعاج للتزاوج
4	 تغذية النعاج قبل التزاوج
6	 الدفع الغذائي
8	 تغذية النعاج خلال فترة التزاوج
9	 تحضير الكباش للتزاوج
10	 تغذية الكباش
11	 فحص الكباش
14	 إدارة الكباش خلال فترة التزاوج

تقديم

هذا الكتيب هو جزء في سلسلة من عشرة أجزاء تتناول المبادئ/الخطوط التوجيهية الفنية التي تصف "أفضل الممارسات لإدارة أغنام العواس" وهي سلالة الأغنام السائدة في عديد من بلدان الشرق الأوسط. وتُستهدف السلسلة مربّي الأغنام ومصنّعي الحليب، وتؤمن لهم نصائح عملية وسهلة المتابعة عن إدارة أغنام العواس تحت ظروف المناطق الجافة.

تعدّ الرعاية الكفوءة، والتغذية وتصنيع الحليب أموراً حاسمة في إدارة أغنام العواس من أجل زيادة الإنتاج والدخل لمربي الأغنام في المناطق الجافة؛ ولكن عديداً من صغار المُنتجين غير مطلعين على الممارسات البسيطة لتحسين الإنتاجية. تهدف هذه السلسلة إلى سدّ هذه الفجوة في المعلومات، لتمكين المزارعين من زيادة دخلهم من الثروة الحيوانية في الوقت الذي يستخدمون فيه الموارد على نحوٍ أكثر كفاءة واستدامة.

تعتمد السلسلة على الخبرة العملية للباحثين، وعلى مدى واسع من المعلومات المرجعية، لالتقاط المعرفة العلمية والمحلية في صيغةٍ باللغة المحليّة يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل مربّي الأغنام ومصنّعي الحليب. وقد تم ترتيب النشرات تبعاً لتقويم/روزنامة إدارة الأغنام، وتصف إدارة نعاغ أغنام العواس أثناء المراحل الفيزيولوجية الهامة على مدار العام. وتؤمن خطوط توجيهية تكميلية معلوماتٍ إضافية عن كل مرحلة.

تم إنتاج هذه الكتيبات كجزءٍ من مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيكاردا "نشر أفضل ممارسات إدارة أغنام العواس للحليب لصغار مربّي الأغنام في غربي آسيا"، المنفّذ في سورية ولبنان بالتعاون مع مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتنمية في كلا البلدين.

نود أن نتوجّه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إعداد هذه المبادئ/الخطوط التوجيهية وكذلك لتمويل هذا المشروع الهام من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد. ونتوقّع أن تكون هذه الكتيبات مفيدة لمربي الأغنام، ومصنّعي الحليب، وموظفي الإرشاد، وكذلك لطلاب التنمية الزراعية ونقل المعرفة.



د. نديم خوري

مدير شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
قسم إدارة البرامج - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية




محمود الصلح

المدير العام لإيكاردا

الدورة الإنتاجية وتغيرات الوزن

يهدف مشروع تربية الأغنام إلى إنتاج أكبر عائد من اللحم والحليب والصوف بأقل التكاليف. وللوصول إلى ذلك يجب اتباع الأساليب العلمية في التربية والتغذية والرعاية الصحية.



تمر النعاج خلال دورتها الإنتاجية بمراحل عديدة (التزاوج، الحمل، الولادة، وإنتاج الحليب). وتتطلب كل مرحلة من هذه المراحل القيام بإجراءات إدارية سليمة وبالتوقيت المناسب.

يبين المخطط المرفق هذه المراحل وتغيرات الوزن لنعجة تزن 50 كغ عند التزاوج وتربي مولوداً واحداً.


نستعرض في هذا الكتيب إدارة النعاج والكباش قبل التزاوج وأثناءه.

تحضير النعاج للتزاوج

لضمان موسم ولادة جيد يجب القيام بالإجراءات اللازمة.

- لضمان موسم ولادة جيد يجب القيام بالإجراءات التالية:
 - تجفيف النعاج قبل 6-8 أسابيع من موعد التزاوج، فالحلابة تثبط الإباضة وتحبط الرغبة بالتزاوج. كما أن عملية التجفيف تعطي النعجة الفرصة لإعادة بناء جسمها والاستعداد للموسم الجديد.
 - فحص النعاج قبل موسم التزاوج واستبعاد كل الحيوانات الهرمة متساقطة الأسنان، وصعبة الولادة، والنافرة التي لا تعتني بمواليدها. كما تستبعد النعاج المصابة بمرض غير قابل للشفاء، كالتهاب الضرع المزمن والإجهاض المتكرر. وتعالج الحالات المرضية إن وجدت. يجب السماح بتزاوج النعاج المنتجة والسليمة صحياً.
 - مكافحة الطفيليات الخارجية قبل 8 أسابيع من موعد التزاوج.
 - مكافحة الطفيليات الداخلية قبل 5 أسابيع من موعد التزاوج.
 - تنفيذ برنامج التلقيحات الوقائية المعمول به في المنطقة بالكامل قبل التزاوج، وذلك لتجنب الحيوانات الإجهاض مع مراعاة إرشادات الصحة الحيوانية في المنطقة.
 - تغذية النعاج وفق احتياجاتها وبما يتناسب مع حالة الجسم، بهدف الوصول بالجسم إلى الحالة المثالية عند التزاوج.






تغذية النعاج قبل التزاوج

يعتمد الإنجاب إلى حد كبير على حالة الجسم، التي ترتبط بكفاءة التغذية قبل موسم التزاوج وخلالها.

- ينبغي أن تكون النعاج بحالة جسمية جيدة عند التزاوج، لذا يجب تقييم حالة الجسم لدى النعاج قبل 8 أسابيع من التزاوج، ثم تقسيم هذه النعاج إلى مجموعات وفق حالتها الجسمية وتعليق كل مجموعة وفق احتياجاتها، وذلك بهدف الوصول بالجسم إلى الدرجة 2.5 - 3.0 من مقياس حالة الجسم (حيث تمثل الدرجة 1 النعجة الهزيلة والدرجة 5 النعجة المكتنزة أو السمينّة جداً).
- تختلف تغذية النعاج من موسم لآخر ومن منطقة لأخرى وذلك حسب توفر المراعي والأعلاف ونوعيتها. عموماً تعتمد معظم القطعان السورية في تغذيتها خلال هذه الفترة على رعي مخلفات محاصيل الحبوب (القمح والشعير) التي يمكنها تغطية حاجة النعاج في تلك الفترة إذا ما أحسن إدارتها، إلا أن استمرار رعي هذه المخلفات لفترة طويلة، يؤدي إلى انخفاض قيمتها الغذائية، وبالتالي إلى الحد من استهلاك النعاج لتلك المخلفات، عندها لا بد من تأمين أعلاف إضافية أو الانتقال إلى مرعى جديد.
- يجب تحديد كمية المخلفات المتاحة في المرعى ومن ثم حساب الفترة التي سيمضيها القطيع في هذا المرعى والتخطيط للانتقال لمرعى جديد. فعلى سبيل المثال يمكن تحميل 20 - 30 رأساً من الأغنام على كل هكتار من مخلفات محصول الشعير البعلي لفترة شهر، حيث تقدر الإنتاجية بـ 1000 كغ بالهكتار، ولكن الأمر يختلف في المناطق المطيرة أو عند رعي مخلفات محاصيل الحبوب المروية.





- تحتاج النعاج الضعيفة والمتهكة جراء تربية الحملان وإنتاج الحليب في الموسم السابق، لدعم غذائي بهدف إعادة بناء جسمها، كما تحتاج النعاج الفتية (النامية) إلى الدعم الغذائي لتلبية متطلبات النمو، ولتكون بحالة جسمية مناسبة للتزاوج.
- يمكن السماح بتراجع في وزن النعاج البدنية بشكل طفيف وتدرجي وذلك لتسهيل عملية التكاثر.

الدفع الغذائي

تؤدي زيادة مستوى تغذية النعاج قبل موسم التزاوج وأثناءه إلى تثبيت الحمل وزيادة معدل الولادات وهذا ما يسمى الدفع الغذائي.

يكون الدفع الغذائي فعالاً للنعاج ذوات الحالة الجسمية المتوسطة والتي تشكل غالبية أفراد القطيع في معظم الحالات. يجب البدء بالدفع الغذائي قبل 3 أسابيع من موسم التزاوج والاستمرار به لمدة 3 أسابيع على الأقل بعد ضم الكباش إلى النعاج. تحتاج النعجة كدفع غذائي إلى ما يقارب 50 % من الإحتياجات الحافظة، علماً أن النعاج البدينة والنعاج الضعيفة لا تستجيب جيداً لعملية الدفع الغذائي.

وزن النعجة (كغ)			
50	45	40	
6.8	6.3	5.8	الاحتياجات الحافظة (ميكا جول باليوم)
3.4	3.15	2.9	احتياج الدفع الغذائي (ميكا جول باليوم)
280	260	240	العليقة المركزة اللازمة لتغطية الدعم الغذائي * (غرام باليوم)

* تحوي العليقة 12 ميكا جول طاقة و 14% بروتين خام لكل كغ من مادة جافة. يمكن توفير الدعم الغذائي عبر ما يلي:

- رعي مخلفات المحاصيل عالية النوعية.
- رعي محصول الشعير غير القابل للحصاد.
- تقديم عليقة مركزة بمعدل 200-300 غ للنعجة يومياً بالإضافة لرعي مخلفات المحاصيل بشكل مفتوح.





المكونات العلفية اللازمة لتحضير طن واحد من العليقة المركزة

المادة العلفية	كغ
شعير	730
نخالة قمح	150
كسبة فطن مقشورة	100
أملاح وفيتامينات	20

تختلف مكونات العليقة المركزة حسب الأعلاف المتوفرة محلياً وأسعارها ويفضل أن تحتوي على طاقة بمعدل 11-12 ميكا جول لكل كيلو غرام وعلى بروتين خام بمعدل 14%.

تحتوي خلطة الأملاح والفيتامينات على فوسفات ثنائي الكالسيوم وملح الطعام وخلطة من الأملاح النادرة والفيتامينات المخصصة للأغنام ويفضل استشارة المرشد الزراعي عند شرائها.

لمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى كتيب الدليل المرجعي للأعلاف من هذه السلسلة.

مكونات خلطة الأملاح والفيتامينات	غ / كغ
فوسفات ثنائي الكالسيوم	600
ملح الطعام	300
أملاح نادرة وفيتامينات	100

تغذية النعاج خلال فترة التزاوج



- يعاد تقييم النعاج قبل ادخال الكباش لمعرفة مدى تأثير التغذية خلال مرحلة ما قبل التزاوج، والتخطيط للتغذية خلال فترة الحمل.
- يجب السماح بتزاوج النعاج التي هي بحالة جسمية مناسبة فقط. الحالة المثالية (2.5-3) ، هذا يعمل على تركيز الولادات (تقصير موسم الولادة) وتقليل المشاكل خلال فترتي الحمل والرضاعة.
- ومع استمرار رعي مخلفات محاصيل الحبوب، تتناقص الكمية المأكولة وتنخفض نوعيتها، عندها يجب الانتقال لمرعى جديد وفي حال عدم توفره، ينبغي توفير المكملات الغذائية المناسبة. وإن تغذية النعجة بمعدل 200 غ يومياً من متمم غذائي يشمل كسبة بذر القطن المقشورة والعناصر المعدنية والفيتامينات يُكمل إحتياجات النعجة ويُشجع على رعي المخلفات الفقيرة، مع الانتباه إلى مراعاة مبدأ التغذية التدريجية عند إدخال أي عليقة جديدة.



المكونات اللازمة لتحضير 100 كغ من المتمم العلفي

كم	المادة العلفية
94.5	كسبة قطن مقشورة
2.5	ثنائي فوسفات الكالسيوم
2.5	ملح طعام
0.5	عناصر نادرة وفيتامينات

لنتذكر

- لا تحتاج النعاج بحالة جسم أعلى من "3" إلى دعم غذائي إضافي.
- يجب مكافحة الطفيليات الداخلية قبل القيام بالدفع الغذائي.
- يجب تجنب النعاج أي نوع من الاجهاد في فترة التزاوج.

تحضير الكباش للتزاوج

يجب الإهتمام بالكبش على مدار العام وخاصة عند اقتراب موسم التزاوج، وذلك لضمان إنتاج حيوانات منوية نشيطة ومخصبة.



- حدد عدد الكباش اللازمة للقطيع. يكفي الكبش البالغ الجيد لـ 25-35 نعجة ويكفي الكبش الفتى بعمر 18 شهر لـ 15-20 نعجة.
- لا تحتفظ بأكثر من حاجة قطيعك من الكباش، لأن ذلك يزيد المصاريف وإن استبدال الكباش الزائدة بنعاج منتجة يزيد الأرباح. علماً أن زيادة نسبة الكباش لا تزيد نسبة الولادة بسبب التنافس والتدافع فيما بينها.
- اشتر الكباش قبل 8 أسابيع من موسم التزاوج وذلك لتتأقلم مع ظروف المزرعة الجديدة، ولضمان خلوها من الأمراض المعدية. يجب اختيار كباش سليمة صحياً ذات عضلات نامية و جيدة النمو ومن مصدر موثوق. وتفضل الكباش المولودة كتوائم وبعمر 3-5 سنوات.
- عالج الطفيليات الداخلية والخارجية، ونفذ التلقيحات الوقائية، إذا لم يتم القيام بذلك مسبقاً. كما يجب معالجة الجروح والالتهابات إن وجدت.
- قم بتقليم الأظلاف إذا كانت طويلة بحرص وعلى مراحل، فالتقليم الجائر قد يسبب صعوبة في حركة الكبش وعند قيامه بالوثب.
- قم بجز الصوف أو تقصيره إذا كان طويلاً، وذلك للتخفيف من الإجهاد الحراري.
- لا تعرض الكباش لأي نوع من الإجهاد واحرص على حظيرتها نظيفة وجافة ومهواة. مع مراعاة إخراجها للتريض بهدف المحافظة على لياقتها.



تغذية الكباش

تؤدي التغذية الزائدة أو الناقصة إلى تخفيض الرغبة الجنسية. إذ لا تملك الكباش الضعيفة، الطاقة الكافية للقيام بالتزاوج وقد تكون حيواناتها المنوية ضعيفة، كما أن الكباش البدنية كسولة وأكثر عرضة للإجهاد.



يجب أن تكون الكباش بحالة جسمية جيدة عند بدء موسم التزاوج (درجة 3-3.5 من مقياس حالة الجسم)، وذلك للحصول على أداء عالي. فبالإضافة لرعي مخلفات محاصيل الحبوب بشكل مفتوح، تحتاج الكباش إلى عليقة مركزة تحوي المعادن والفيتامينات، وتختلف الكمية اللازمة حسب حالة الجسم. عموماً يمكن إطعام 650-800 غ في اليوم من عليقة متزنة تحوي الأملاح والفيتامينات قبل 6-8 أسبوع من بدء موسم التزاوج وخلالها للمحافظة على الجسم ولتحسين حالة الخصيتين ولإنتاج مخزون من الحيوانات المنوية، علماً أن الفترة اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية هي 7 أسابيع. ويجب مراعاة التدريب عند إدخال هذه العليقة.



فحص الكباش


يعتبر فحص الكباش مهم لتحديد صلاحيتها للتزاوج. افحص الكباش قبل شهرين من بداية موسم التزاوج واستبعد أي كبش مريض أو لا يحمل المواصفات المطلوبة. إن الاحتفاظ بكبش ضعيف الخصوبة هو خسارة مؤكدة. ولنتذكر أن عيوب النعجة تظهر في مولودها، أما عيوب الكبش فتظهر في القطيع.



ما يجب فحصه

حالة الجسم

يجب أن تكون الكباش سليمة وخالية من الأمراض المعدية، ومن التقرحات والكدمات وبحالة جسم مثالية 3-3.5 على مقياس من 1-5 (حيث 1 ضعيف جداً و 5 سمين جداً) وذلك عند بداية موسم التزاوج، علماً أن الكباش قد تفقد 15% من وزنها خلال فترة التزاوج. لذا يجب تعديل التغذية في الوقت المناسب.



الخصيتان

يجب القيام بفحص الخصيتين للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الجروح والأورام، ويفضل أن تكونا متوازنتين وممتلئتين وكبيرتي الحجم، وليستا قاسيتين ولا اسفنجيتين. إن حجم الخصية مؤشر على كمية الحيوانات المنوية المخزنة وكلما كانت الخصيتان أكبر زادت القدرة على تلقيح النعاج. ينبغي أن تنزلق الخصيتان بحرية داخل كيس الصفن. وأن يكون ذيل البربخ ممتلئاً وبارزاً. إذا كان لديك شك بوجود ضمور أو ورم في الخصيتين أو البربخ أو الحبل المنوي، استشر الطبيب البيطري ولا تردد من فحص حيوية وتركيز السائل المنوي إذا توفرت هذه الخدمة في منطقتك.



القضيب والغمد

يجب الكشف عن القلفة للتأكد من سلامة القضيب وخلوه من الأورام أو التقرحات أو الالتهابات.



الأظلاف والقوائم

من المهم أن يتمتع الكبش بالقدرة على الحركة والوثب، لذا يجب التأكد من سلامة الحوافر وخلوها من العرج والتعفنات أو الإلتهابات، وعند الضرورة يجب تقليم الأظلاف ومعالجتها وبغناية.



العيون

يجب أن تكون العينان مشرقتين براقتين ويقظتين، وتكون الأجفان من الداخل بلون وردي (خاليتان من علامات فقر الدم).



الأسنان

يجب أن تكون الأسنان قوية وسليمة إذ يؤدي فقدانها أو تأكلها إلى ضعف القدرة على الرعي.

يجب استبدال الكباش إذا تجاوز عمرها خمس سنوات. عادة تصل الكباش إلى ذروة الأداء بعمر 3-4 سنوات. ويفضل استبعاد الكباش بعمر 6 سنوات.



إدارة الكباش خلال فترة التزاوج

تتميز أغنام العواس بموسم تناسل طويل، وقد تتناسل على مدار العام إذا توفرت لها الظروف البيئية المناسبة.



- ينصح بالتحكم بموسم التزاوج بهدف توقيت الولادة بما يناسب المربي ويعود عليه بالفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الأعلاف والأيدي العاملة وأسعار الحليب والفترات التي يزداد فيها الطلب على الخراف...
- تفصل الكباش عن النعاج ويتم تحضيرها للتزاوج ثم يضمن معاً في الوقت المناسب، ولفترة محددة. على سبيل المثال 51 يوماً (ثلاث دورات شبق) ثم يعاد فصلهما. بهذه الطريقة تكون الولادات متقاربة، مما يسهل إدارة القطيع.

ماذا يحدث إذا بقيت الكباش مع النعاج باستمرار؟

- قد تتم ولادة النعجة في أي وقت، فتلد بأوقات غير مناسبة.
- قد يتم التزاوج والنعاج بحالة جسمية غير مناسبة.
- يصعب القيام بالخدمات الصحية الوقائية والتغذية بالوقت المناسب.
- تزداد تكاليف إدارة القطيع، وتكون عمليات التسويق صعبة وغير فعالة.
- زيادة احتمالات حالات زواج الأقارب.

تاريخ التزاوج	تاريخ الولادة المتوقع
1 حزيران	29 تشرين أول
8 حزيران	5 تشرين ثاني
15 حزيران	12 تشرين ثاني
22 حزيران	19 تشرين ثاني
29 حزيران	26 تشرين ثاني
6 تموز	3 كانون أول
13 تموز	10 كانون أول
20 تموز	17 كانون أول
27 تموز	24 كانون أول
3 آب	31 كانون أول
10 آب	7 كانون ثاني
17 آب	14 كانون أول
24 آب	21 كانون أول
31 آب	28 كانون أول

استخدام الحزام

يمكن أن تجهز الكباش بحزام مع مادة معلمة، وعند إعتلاء الكبش يترك علامة على صوف ظهر النعجة الملقحة، وبذلك يمكن تحديد موعد التلقيح. كما يمكن تحديد مدى نجاح الكبش بالتخصيب بتغيير لون المادة المعلمة كل 17 يوماً. وإذا أعاد الكبش تعليم العديد من النعاج فهذا مؤشر على انخفاض في كفاءة الكبش.



استخدام الكبش الكشاف

يمكن التأكد من حدوث الحمل بوضع النعاج الملقحة مع كبش كشاف (الكبش الكشاف هو كبش تم قطع الوعاء الناقل للحيوانات المنوية لديه) ومراقبة هذه النعاج، إذا لم تظهر علائم الشبق بعد 17 يوم فهذا يدل على ثبات الحمل.

لنتذكر

- يجب مراقبة عملية التزاوج، وتسجيل تاريخ تلقيح كل نعجة إن أمكن، وبذلك يمكن توقع موعد الولادة بإضافة 150 يوماً إلى موعد التزاوج.
- عند استخدام أكثر من كبش في القطيع، حاول استخدام كباش متماثلة من حيث الحجم والعمر.
- قم بتدوير (تبديل) الكباش كل أسبوعين إذا كنت تملك أكثر من قطيع.
- ينبغي أن يوفر للكباش مكان ظليل وماء نقي خلال موسم التكاثر.
- في الأيام شديدة الحرارة، يفضل إيواء الكباش ظهراً، غالباً ما تقوم الكباش بالنزول في الصباح الباكر وعند المساء.
- ينصح بتبديل الكباش كل ثلاث سنوات للحد من مشكلة زواج الأقارب.
- إذا كان هناك كبشين أو أكثر مع النعاج فقد يمضيا معظم الوقت بالتدافع أو التناطح. لذا ينبغي أن تُستخدم الكباش بالتناوب، حيث تُبدل مرة كل يومين أو تُبدل صباحاً ومساءً.
- من المهم تمكين الكباش الفتية التي أدخلت حديثاً إلى القطيع من القيام بالتلقيح خلال موسمها الأول، وذلك لتهيئتها للقيام بدورها في المستقبل.
- يجب أن تفحص الكباش بشكل دوري للتحري عن أي كدمات أو جروح، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.



أفضل الممارسات في إدارة أغنام العواس

- 1 مرحلة التزاوج
- 2 مرحلة الحمل
- 3 الولادة
- 4 مرحلة إنتاج الحليب
- 5 الحلابة وتصنيع الحليب
- 6 إنتخاب النعاج والكباش للتربية
- 7 دليل العناية بالصحة
- 8 الدليل المرجعي للأعلاف
- 9 تحضير التبن المعامل باليوريا
- 10 تقييم حالة الجسم



المركز الدولي للبحوث
الزراعية في المناطق الجافة



الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الجمهورية العربية السورية